

편안한 그 날을 위해

멘자펜[®]

월경 전·후의 제증상 치료제

일반의약품

분류번호:190

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

■원료약품 및 그 분량 : 1정 중

주성분 : 아세트아미노펜 (KP)500mg

주성분 : 카페인수화물 (KP)60mg

주성분 : 말레인산피릴라민 (USP)15mg

착색제(타르색소) : 적색3호, 황색5호

■성상

분홍색의 장방형 필름코팅정제

■효능·효과

월경시 여러 증상 완화 : 경련(심한 복통), 부기(부종), 두통, 요통, 근육통, 피로감

■용법·용량

성인 및 12세 이상의 소아는 1회 2정을 물과 함께 복용한다. 필요시 6시간 간격으로 복용한다.

1일 총 용량은 8정을 초과하지 않는다.

12세 미만의 소아는 의사 또는 약사의 지시에 따른다.

■사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에게는 투여(복용)하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약 구성 성분에 과민반응 환자

2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3) 아세트아미노펜이 함유된 다른 약물을 이미 복용하고 있는 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 다른 해열진통제, 감기약, 진해거담제(기침가래약), 항히스타민제

2) 바르비탈계 진정제, 삼환계 항우울제 및 알코올을 복용한 환자 (다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있으며, 특히 알코올은 아세트아미노펜 과량투여(지나친 복용)의 간독성을 증가시킬 수 있다.)

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

1) 복용하는 동안 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.

2) 음주는 이 약을 과량투여(지나친 복용)할 때 생기는 간독성을 더 악화시킬 수 있으므로 피할 것.

3) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

2) 지금까지 약에 의해 알레르기증상(발진, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

3) 간장, 신장(콩팥), 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등의 병이 있는 사람

4) 물이 약한 사람

5) 고열이 있는 사람

6) 고령자(노인)

7) 임부 및 수유부

8) 심장질환자

9) 전신홍반루푸스 또는 혼합성 결합조직병 치료를 받고 있는 환자(심한 두통, 발열, 구역, 구토등의 이상반응이 증가 할 수 있다.)

10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

6. 다음과 같은 사람은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배고곤란, 어지러움 등의 증상이 나타난 경우

2) 목이 당기는 심한 두통, 발열이 나타난 경우

3) 황달 또는 전신의 부종(부기), 혈뇨(피오줌), 단백뇨 등의 증상이 나타난 경우

4) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우

5) 고열을 동반하는 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 확산모양 수포(거품) 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

6) 천식이 나타난 경우

7. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 수화(여러차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

3) 장기간 연속 복용하지 말 것.

4) 과량투여(지나친 복용)시 간손상을 일으킬 가능성이 있으므로 즉시 병원에서 신속한 의료적 처치를 받을 것.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사일광을 피하여 건냉한 곳에 실온보관할 것.

3) 오·남용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

※ 어린이 안전용기(Hard push foil)를 사용한 제품입니다.

개봉시, 제품 파손이 우려되므로 뒷면의 은박(foil)부분을 손톱으로 눌러

(가급적 제품의 중앙부분을 피하여) 개봉바랍니다.

■저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■사용기간 : 제조일로부터 36개월

■포장단위 : 10정(Case)

첨부문서 최종 작성년월일 2005.05.31

첨부문서 최종 개정년월일 2015.01.08

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식물의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

DS-1501-05

제조 및 판매원

동성제약주식회사

공장 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

본사 : 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)

소비자 상담전화 : 080-001-0921

www.dongsung-pharm.co.kr