

원료약품의 분량(1매 7x10cm² 1.0g중)

케토프로펜(KP) 30mg

일반의약품

분류번호 264 (진통·진정·수렴·소염제)

성상

이 약은 무색투명한 점착성 물질을 린트포에 도포(바름)하여 고체면에 바리(벗겨짐)지를 덮은 첩부제입니다.

효능·효과 : 다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염) ① 퇴행성 관절염(골관절염)

② 어깨관절 주위염 ③ 건(힘줄)·건초염(윤활막염) ④ 건(힘줄)주위염 ⑤ 삼완골(위팔뼈)상과염(테니스 엘보우증) ⑥ 근육통 ⑦ 외상후의 종창(부기)·동통(통증)

용법·용량 : 약면의 바리(벗겨짐)지를 떼어낸 후 환부(질환부위)에 1일 2회 부착합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 및 광과민증의 병력이 있는 환자 2) 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 3) 다음의 약물에 과민증의 병력이 있는 환자 : 티아프로펜산, 페노피브레이트, 메자피브레이트, 시프로피브레이트, 옥시벤존(케토프로펜과 교차과민반응을 유발할 수 있습니다) 4) 임신기간 6개월 이상인 임부 : 임신말기의 갱트에 이 약을 경구(먹는)투여한 실험에서 태자의 동맥혈관수축이 보고되었습니다. 임신후기에 투여(경구먹는), 주사, 직장 주입시 지속성 태아순환, 태아 신부전이 나타났다는 보고가 있습니다. 5) 15세 미만의 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의합니다. 1) 기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 임부 또는 수유부(안전성이 확립되어 있지 않으므로 대량 또는 광범위에 걸친 장기간의 사용을 피합니다.)

3. 다음과 같은 경우는 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의합니다. 성명시 가능한 한 이 문서를 소지하십시오. 1) 드물게 속, 아나필릭시양증상(두드러기, 호흡곤란, 얼굴부기 등 과민성유사증상)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 2) 천식발작을 유발할 수 있으므로 건성 수포음(거품소리), 천명(숨을 쉴때 거품), 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지합니다. 천식발작은 이 약 적용 후 수시간 내에 나타납니다. 3) 피부 : 때때로 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 가려움, 수포, 짓무름, 자극감 및 종창(부기) 등의 접촉피부염, 피부건조 및 색소침착이 나타날 수 있습니다. 또한 직사광선(자외선)에 의해 광과민증이 나타날 수 있으며 피부발진이 전신으로 확대될 수 있습니다. 이러한 증상이 심한 경우에는 사용을 중지해야 합니다. 4) 1주일 정도 사용하고도 증상개선이 보이지 않을 경우 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항 1) 이 약을 사용 중이거나 사용 후 2주까지는 날씨에 관계없이, 옥외활동을 피하고, 일상 외출할 때에는 이 약의 도포부위를 옷, 선글라스, 모자, 자외선 차단제 등으로 가려 자외선에 노출되지 않도록 합니다. 흰색이나 얇은 옷은 자외선을 투과시킬 수 있으므로 유색 옷을 입습니다.(자외선에 의해, 사용 중 또는 사용 후 광과민증이 나타났다는 보고가 있습니다.)

2) 이 약에 의한 치료는 원인이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)입니다. 3) 피부감염증을 드러내지 않게 할 수 있으므로 감염에 수반되는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 부작용 발현(드러냄, 드러내보임)에 유의해야 합니다. 4) 만성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려합니다. 또한 상태를 충분히 관찰하여 이상반응에 유의해야 합니다. 5) 눈 및 점막에는 사용하지 않습니다. 6) 손상된 피부 및 점막, 습진 또는 발진 부위에 사용하는 경우 일시적인 자극 및 날카로운 통증을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의합니다. 7) 무중, 백선 등에는 사용하지 않습니다. 8) 밀봉봉대법을 사용하지 않습니다. 5. 저장상의 주의사항 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

안전한 사용방법

1. 이 약은 무릎과 같은 관절에 적합한 강한 접착력을 가진 제품으로 건조한 피부나 목과 같이 연약한 부위에 사용한 경우 미온수로 적당히 불려서 떼는 것이 좋습니다.
2. 햇볕에 노출되는 부위에 사용한 후에는 봉대나 의복 등으로 부착 부위를 가려주면서 광과민성으로 인한 피부 이상반응을 예방할 수 있습니다.
3. 피부 알러지 방지를 위하여 동일부위에 연속적으로 사용하는 것은 피해주시고 가려움증이나 발적(충혈되어 붉어짐), 발진이 나타날 경우 사용을 중지하시기 바랍니다.
4. 사우나, 온찜질 전후에는 피부 각질이 약해지고 내피가 손상되기 쉬우므로 본 제품을 부착하실 때 주의하십시오.

※ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

※ 이 문안은 2014년 4월 15일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : 대화제약(주)

강원도 횡성군 횡성을 한우로 495

※ 케노펜 -5140415

제조의회사 : 일동제약주식회사

본사 : 서울특별시 서초구 바우로 27길 2

공장 : 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)



제조번호 :
사용기한 :

관절염 · 근육통

근육통, 관절통, 타박상으로 인한
통증이 있으시다고요?

관절염 근육통 이젠 편하게 OK!

케노펜[®] 플라스타
(케토프로펜 30mg)

신축력·무착력·흡수력이 좋습니다

7매