

유니렌TM 점안액

(요오드화칼륨·요오드화나트륨)

【원료약품 및 그 분량】1mL 중

주성분 : 요오드화칼륨(KP).....3mg
 요오드화나트륨(KP).....3mg (총 요오드로서 4.83mg)
 보존제 : 파라옥시벤조산메틸 (KP).....0.15mg
 파라옥시벤조산프로필 (KP).....0.08mg
 등장화제 : 염화나트륨
 안정제 : 에데트산나트륨수화물
 완충제 : 인산이수소나트륨, 인산일수소나트륨
 무통화제 : 클로로부탄올
 용 제 : 주사용수

【성상】

이물을 관찰하는데 지장이 없을 정도의 투명성이 있는 용기에 들어있는 무색투명한 액

【효능·효과】

노화·근시·고혈압·당뇨병·정맥주위염으로 인한 출혈, 노인성 백내장 초기증상으로
 서의 렌즈혼탁

【용법·용량】

성인 - 1회 1방울, 1일 1~3회 점안한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 갑상선 기능 이상 환자
- 3) 임부 및 수유부, 소아

2. 부작용

- 1) 국소 : 이 약 투여 후 잠시동안 약간의 작열감을 느낄 수 있다. 때때로 눈물 분
 비량이 증가할 수 있다.
- 2) 전신 : 이 약은 요오드를 함유하고 있으므로 갑상선 기능항진증을 유발할 수
 있으며 여드름 소인이 있는 환자에서 여드름양 효과를 나타낼 가능성이 있다.
- 3) 첨가제 : 이 약은 인산염을 포함하고 있다. 상당한 각막 손상이 있는 일부 환자
 에서 인산염 함유 점안액의 사용과 연관되어 각막 석회화의 사례가 매우 드물게
 (0.01% 미만) 보고된 바 있다.

3. 일반적 주의

콘택트렌즈 착용자는 렌즈 제거 후 이 약을 투여하며 투여 후 30분이 경과한 다음에
 다시 렌즈를 착용한다.

4. 적응상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용한다.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 한다.
- 3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
- 4) 사용기간이 경과된 것은 사용하지 않고 개봉 후 1개월 이상 경과된 것은 사용
 하지 않는다.

5) 전신 작용을 최소화하기 위해 이 약 투여 후 1~2분간 손가락으로 누당을 가
 법게 눌러주면 좋다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 사용 후 즉시 뚜껑을 닫는다.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.
- 4) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】15mL/병

【제조사】유니메드제약(주) - 충남 아산시 실목로 110-27

잘못된 사용방법



점안액이 나오는 용기의 끝부분이 손이나 눈에 닿으면 점안액이 오염됩니다.

첨부문서 작성년월일 : 2017. 01. 12

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패
 또는 오손된 제품은 약국·병원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
 ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해
 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎고객상담실 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩