

포리그론

연질캡슐

(사유, 레티놀팔미테이트유, 에르고칼시페롤, 동클로로필)



이 약을 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

포리그론은 동물성 생약성분과 레티놀을 복합 처방하여 눈이 쉽게 침침해지고 건조해지는 분, 장시간 컴퓨터를 사용하는 직장인, 수험생, 운전자, 청소년 등의 시력개선 및 노인성 안과 질환의 예방에 효과적인 현대인을 위한 눈염양제입니다.

【원료약품 및 그 분량】1캡슐 중

- 사유(K.P.C) 296.7mg
- 레티놀팔미테이트유(K.P.C) 2.0mg (비타민A로서 2,000 I.U)
- 에르고칼시페롤(K.P) 200I.U
- 동클로로필(벌규) 0.3mg
- [첨가제]타르색소 : 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 동물유래성분 : 사유(Ancistrodon rhodostoma • Ancistrodon bimibiffer • 근연동물, 장간막내 지방층), 백납(벌, 벌집)

【성상】연한녹황색의 점조성 내용물이 든 암갈색의 연질캡슐

【효능·효과】

- 1. 다음 증상의 완화: 눈의 건조감
- 2. 치골의 발육불량
- 3. 야맹증
- 4. 구루병 예방
- 5. 다음 경우의 비타민A,D의 보급: 임신 수유기, 병중 · 병후 체력저하 때, 발육기, 노년기

【용법·용량】

15세 이상의 성인: 1일 1회, 1회 2캡슐
7세 이상~15세 미만: 1일 1회 1캡슐씩 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 경고
임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000 I.U. 이상을 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 I.U/일 이상 투여하지 말 것.(비타민A결핍증 환자는 제외)
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
 - 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우
 - 피부부(가려움), 소화기(오심, 구토)
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

- 3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 헤장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 4. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000 I.U 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있다.)
- 5. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 설사
- 6. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 7. 일반적 주의
지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 8. 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 할 것.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】자사포장단위

【제조사】(주)서흥 - 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【제조외사】유니메드제약(주) - 충남 아산시 실옥로 110-27

【판매자】(주)종근당 - 충남 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
☎고객상담실 : 080-6776-080

첨부문서 작성년월일 : 2014. 08. 19

* 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
* 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터실을 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎고객상담실 : 080-500-5100

판매자



제조외회사

UNIMED유니메드제약
(본사)서울특별시 송파구 삼전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩