



분류번호: 331

전문약의약품

씨제이 염화나트륨/포도당주사액^(1:2) ^(1:3) 1:2/1:3/1:4 Sodium Chloride & Dextrose Inj.

●원료약품 및 그 분량 이 약 1,000밀리리터 중

구성분	(1:2)	(1:3)	(1:4)
염화나트륨(약전)	3.0그램	2.25그램	1.80그램
포도당(Dextrose)(유에스피)	33.32그램	37.50그램	40.00그램
용제			
주사용수(약전)	적 량	적 량	적 량

●성상

외부를 반투명의 고밀도 폴리에틸렌으로 포장한 무색투명한 수액용 플라스틱 용기에 충전된 무색투명한 수액용 주사제.

●효능·효과

1. 탈수증, 수술전후 등의 수분· 전해질 보급
2. 에너지 보급

●용법·용량

보통 성인 1회 500~1,000mL를 점적 정맥주사한다.
투여속도는 시간당 300~500mL(분당 75~120방울)이고, 소아의 경우 시간당 50~100mL로 한다. 특히 신생아, 미숙아에는 급속주입(시간당 100mL 이상)하지 않는다.
투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다.

●사용상의 주의사항

1.경고

포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민 B1)소모율이 높기때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 수분과다상태 환자
- 2) 저장성 탈수증 환자
- 3) 저칼륨혈증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신질환에서 기인한 신부전 환자
- 2) 심부전 환자
- 3) 고장성 탈수증 환자
- 4) 폐쇄성 오로질환에 의한 요량감소가 있는 환자
- 5) 당뇨병 환자
- 6) 고염소혈증 환자

4. 이상반응

- 1) 대량· 급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 산증, 수종독이 나타날 수 있다.
- 2) 신생아, 미숙아에 급속투여(시간당 100mL 이상)하는 경우 수종독이 나타날 수 있다.
- 3) 주입정맥에서 혈전증이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

혈당, 혈청 전해질, 체액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.

6. 임부, 수유부, 기임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 투여

- 1) 유아 및 고령자에게는 급속 또는 장시간 투여해서는 안된다.
- 2) 고령자에 투여시 특히 중증 심부전 및 신부전 환자에게는 순환과부하를 피하기 위해 주의하여 투여하여야 한다.

7. 과량투여시의 처리

이노제를 투여하여야 한다.

8. 적응상의 주의

- 1) 투여전
 - (1) 투여전에 감염에 대한 처치를 한다.
(환자의 피부나 기구 소독)
 - (2) 한행기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다.
 - (3) 개봉 후 즉시 사용하고, 잔액은 사용하지 않는다.
- 2) 투여시
 - 천천히 정맥주사한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항 실온에서 보관한다.

●저장방법 일봉용기, 실온보관 (1~30℃)

●포장단위 500, 1000밀리리터

* 본 제품은 '우수의약품 제조관리 기준(KGMP)' 에 따라 제조 및 품질관리를 필한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나, 변질·변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.

* 수액세트 스파이크 삽입 또는 역류 추가 고무전 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.

* 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.

* 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

* 냉동 및 가열 금지

* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>)→(의약품유해사례보고)에 알려십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjpc.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

설명서 작성연월일: 910226


설명서 개정연월일: 140501

제조사 : **씨제이헬스케어주식회사**

충청북도 음성군 대소산단로 20


고객행복센터 : 080-700-8802

Safe-Flex® 용기의 사용방법




1

Safe-Flex 용기의 윗부분을 원상으로 고정시킨 다음, 오른손 엄지손가락으로 걸라진 부분을 잡고 오른팔을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 걸포즈를 제거합니다.




2

제품의 이상여부를 확인한 다음, 약제를 추가하는 경우에는 노란 고무막으로 덮여있는 입구에 19~22gauge 주사 바늘을 사용하여 약제를 주입하여 5~6회 주입해도 무방합니다.




3

푸른색 보호막을 밀어 찢어서 제거합니다.




4

수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



5

주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 ±5% 이내입니다.



6

주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업체가 회수하도록 합니다.