



분류번호: 331

전문 의약품

씨제이 플라스마솔루션에이 주 Plasma Solution A Inj.

● 원료약품 및 그 분량 이 약 1,000밀리리터 중

주성분 : 염화나트륨(약전)	5.26그램
글루콘산나트륨(USP)	5.02그램
아세트산나트륨수화물(약전)	3.68그램
염화칼륨(약전)	0.37그램
염화과나트륨(USP)	0.37그램
용 제 : 주사용 수(약전)	적량
* 총 나트륨 : 3.22그램, 총 염소 : 3.48그램, 칼륨 : 0.19그램	
마그네슘 : 0.036그램	

● 성상

외부를 반투명의 고밀도폴리에틸렌으로 포장한 무색투명한 수액용 플라스틱용기에 충전된 무색투명한 수액을 주사제

● 효능 · 효과

1. 수혈혈액량 및 조직간액의 감소시 세포외액의 보급 · 보정
2. 대사성 산증의 보정

● 용법 · 용량

보통 성인 1회 500~1,000mL를 점적 정맥주사한다.
투여속도는 시간당 200mL로 한다.
투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 수분과다상태 환자
 - 2) 고나트륨혈증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 1) 울혈성심부전, 신부전 및 나트륨 저류로 인한 부종 환자
 - 2) 고칼륨혈증, 칼륨 저류 환자
 - 3) 대사성 또는 호흡성 알칼리증 환자
 - 4) 초산염이나 글루콘산염이 증가되어 있거나 간부전과 같이 이러한 이온의 이용이 손상된 환자

5) 고장성 탈수증 환자

6) 지나트륨혈증(120 mmol/L 미만) 환자

3. 이상반응

- 1) 주사부위의 열감, 감열, 정맥혈전증, 정맥염, 삼출, 과다혈량이 나타날 수 있다.
- 2) 대량 · 급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 대사성 알칼리증이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약은 나트륨을 함유하므로 코르티코스테로이드 또는 코르티코트로핀 투여를 받는 환자는 주의하여 투여한다.
 - 2) 혈당, 혈청 전해질, 체액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.
5. 임부, 수유부, 기임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 투여
임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

● 저장방법 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)

● 포장단위 500, 1000밀리리터

* 본 제품은 '우수의약품 제조관리 기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 필한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효 기한이 경과되었거나, 변질 · 변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.

* 수액세트 스파이크 삽입 또는 약물 주가 혼주시 고무전 파면이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.

* 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.

* 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.

* 냉동 및 가열 금지

* 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.

* 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → (의약품 유해사례보고)에 알려십시오.

* 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.

설명서 작성연월일: 950516


설명서 개정연월일: 140501

제조사 : 씨제이헬스케어주식회사


충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

고객행복센터 : 080-700-8802

■ Safe-Flex® 용기의 사용방법




1



2

Safe-Flex 용기의 윗부분을 완손으로 고정시킨 다음, 오른쪽 엄지로 걸라진 부분을 잡고 오른쪽을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (물과 수직방향) 걸포장을 제거합니다.




3

푸른색 보호막을 밀어 젖혀서 제거합니다.




4

수액세트의 스파이크를 우측으로 돌리면서 삽입합니다.



5

주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 ±5% 이내입니다.



6

주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업자가 회수도록 합니다.