

디아솔에스[®]액

|포도당|

· 원료약품 및 그 분량 (100mL 중)

주성분 : 포도당(KP)	50g
보존제 : 벤조산나트륨	60mg
착색제 : 황색 5호	적량

· 성 상 : 레몬향이 나는 황색의 액체

· 효능·효과 : 포도당 내성을 측정함으로써 당뇨병과 그와 관련된 질환 상태를 진단

· 용법·용량

○ 성인

성인(임부제외) : 포도당 75g을 투여하십시오.

임부 : 포도당 100g을 투여하십시오.

○ 소아

체중 kg당 포도당 1.75g을 투여하고 포도당으로 75g을 초과하지 않아야 합니다.

· 사용상의 주의사항

1. 다음의 환자에는 투여하지 마십시오.

포도당-갈락토스 흡수장애 환자

2. 다음의 환자에는 신중하게 투여하십시오.

- 1) 요붕증 환자
- 2) 이 약은 황색5호(섀넬로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 구토, 때때로 복부팽만감, 설사, 복통 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 두통 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 의사의 지시에 의해 경구투여하십시오.
- 2) 시험전날에는 의약품 등의 투여를 중지하고 폭음, 폭식 및 음주를 금하십시오.
- 3) 검사하기 12시간 전부터 공복을 유지해야 하며 검사는 아침에 공복상태에서 실시하고 검사종료 시까지는 물 이외에 섭취하지 않도록 합니다.
- 4) 검사 중에는 안정하고 편안한 자세를 취하며 격격한 운동을 피하도록 합니다.
- 5) 검사전과 검사 중에는 담배를 피우지 않도록 합니다.

- 6) 검사결과는 다음과 같은 요인에 의해 영향을 받을 수 있으므로 검사전 및 검사 중 환자의 상태를 잘 관찰하여 결과 판정에 참고하십시오.
질병(고도의 체외 분비기능장애, 고지혈증, 간장애, 동맥경화성 혈관장애, 뇌장애, 위장장애, 감염증), 임신, 스트레스, 소화흡수, 기아, 운동, 비만, 가령, 장기 입원, 의약품투여 등

- 7) 이 약은 벤조산 나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있습니다.

5. 상호작용 : 하제는 이 약의 장내흡수를 저해할 수 있습니다.

6. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하여 사용하십시오.

7. 저장상의 주의사항 : 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

· 저장방법 : 차광, 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

· 포장단위 : 100mL (포도당 50g함유) / 150mL (포도당 75g함유) / 200mL (포도당 100g함유)

· 제조판매원 : 태준제약 본사 : 서울특별시 용산구 대사관로31길 8 공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 꼭 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약품서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원 (www.drugsafe.or.kr) → 의약품유해사례보고에 알려주십시오.

※ 소비자문의 : (주)태준제약 CS팀 (02)799-0271

※ 이 첨부문서의 작성년월일은 1999년 12월 18일이며, 개정년월일은 2015년 04월 28일입니다. 개정년월일 이후 변경된 내용은 태준제약홈페이지 (www.taejoon.co.kr)나 전화번호 02-799-0271에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일, 개정년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.