

정우안심액(천왕보심단)

일반의약품 / 분류번호 : 219

【제품명】 정우안심액(천왕보심단)

【원료약품 및 그 분량】 1회용량(15mL) 중

생지황(생규)	500mg
인삼(KP)	62.5mg
현삼(KP)	62.5mg
단삼(KP)	62.5mg
원지(KP)	62.5mg
길경(KP)	62.5mg
복령(KP)	62.5mg
오미자(KP)	125mg
당귀(KP)	125mg
천문동(KP)	125mg
맥문동(KP)	125mg
백지인(KP)	125mg
산조인(KP)	125mg
황련(KP)	250mg

————— 이상 연조엑스로서 640mg —————

*첨가제(보존제) : 벤조산나트륨(KP) 9mg

*기타첨가제 : 백당, 시트르산수화물, 시트르산나트륨수화물, 인삼향, 정제수

【성 상】 알루미늄호일 파우치 또는 갈색 유리병에 든 담갈색의 액제

【효능·효과】 불면, 불안, 초조, 목마름, 두근거림, 숨찬, 신경쇠약, 건망, 변열(가슴이 답답하고 열이 나는 증상 등)

【용법·용량】 보통 성인 1포(15mL) 또는 1병(15mL)을 1일 1회 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【저장 방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 황련에 의해 유·조산(조기분만의 위험이 있다.)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 복통(배앓음), 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 2) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 3) 고령자(노인)일뿐더러 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담이 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 피부 : 발진, 두드러기 등

(2) 소화기계 : 식욕부진, 복통(배앓음), 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등

2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

3) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【사용 기간】 제조일로부터 36개월

【포장 단위】 1병 또는 1포(15mL) X 자사포장단위

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2018년 04월 23일 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60