

시레보정

(레보셀피리드)

SIREBO Tab.

전문 의약품 분류번호: 239

원료약품 및 그 분량 1정 중

레보셀피리드(KPC)..... 25 mg

성 상 백색의 원형정제

효능 및 효과

기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 :
복부팽만감, 상복부부종감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

용법 및 용량

통상 성인 1회 1정, 1일 3회 식전 복용

저장방법

기밀용기, 실온(1~30 °C)보관

사용상의 주의사항

1. 다음 현저하게 투여하지 말 것. 1) 임신중이거나 임신하고 있을 가능성이 있는 환자 2) 위장관운동장애가 극히 유해한 환자 즉, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자 3) 갈색색소증 환자에게는 이중 양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있으므로 투여하지 말 것. 4) 이 약에 과민성이 있거나 불내성의 환자 5) 간질환자, 조영 상태, 이중조영의 조영단계의 환자 6) 대부분의 항정신성 약과 혼이 가지고 있는 프롤라틴 과분비 효과와 유방 형성 장애간에 상호관련성이 있다고 여겨지므로 악성유선종 환자에게는 투여하지 말 것. 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 고혈압 환자 2) 소아(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의 할 것.) 3) 고령자 3. 부작용 1) 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비기능조절이상(그나드트로핀부) 및 프로락틴분비 이상에 기인한다고 추정되는 무월경, 지속성 유즙누출, 여성형 유방이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지한다. 2) 추체외로계 : 드물게 진전, 현의 곤어지, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지한다. 또, 장기투여에 의해서 드물게 입주위 등에 불수의 운동이 나타나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있다. 3) 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다. 4) 순환계 : 고혈압이 나타날 수 있다. 5) 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지한다. 또한 때때로 열진, 권태감, 불면, 졸음, 현기, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 열위가 나타날 수 있다. 6) 장기투여의 경우 무월경, 여성형유방, 유종분비과다 및 성욕의 증감과 같은 부작용이 나타날 수 있는데 이는

다른 신경이완제들과 유사하게 시상하부 뇌하수체 생식선 제2경주의 기능에 대한 효과로서 가역적이다. 4. 일반적 주의 1) 간뇌의 내분비기능조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하여 유즙누출의 부작용이 있으므로 처방전 반드시 이러한 부작용이 있음을 환자에게 주지시킨다. 2) 간뇌의 내분비기능조절이상, 추체외로 증상 등의 부작용을 일으킬 수 있으므로 유초성과 안전성을 충분히 고려하여 투여한다. 3) 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야 하는 기계작업을 피하는 것이 좋다. 5. 상호작용 1) 위장관 운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린성 약(아트로프, 메칠스코폴라민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용하지 말 것. 2) 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현상 할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다. 3) 다른 벤조아미드계 약제(메토클로프미드, 타이피라이드 등)와의 병용에 의한 내분비기능이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다. 4) 정신약리학 작용과의 병용투여는 상호작용에 기인한 예기치 않은 부작용을 피하기 위해 충분한 주의가 요구되며 알코올과의 동시투여는 피해야한다. 6. 임부에 대한 투여 동물시험에서 태아에 대한 기형발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으므로, 임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여할 것. 7. 수유부에 대한 투여 신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 8. 고령자에 대한 투여 주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 부작용(추체외로 증상 등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여한다. 9. 기타 1) 전신적 약효 있기 때문에 다른 약에 기인하는 증독, 정맥제, 뇌출혈에 의한 구토증상이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여한다. 2) 동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있다. 3) 펫트 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있다.

제제 의뢰자

조아제약(주) 경남 함안군 함안면 파수리 465

제 조 자

뉴젠팜(주) 전북 익산시 석암동 649

포 장 단 위

30정, 500정

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. * 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환에 드립니다. * 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의가 필요합니다. * 의약품과 함께 보관하여 주십시오. * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오. * 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 연락하십시오. * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드래(http://ezdrug.kida.go.kr) → [정보마당] → [의약품 등 정보] 를 참조하십시오.

조아제약(주)
CHO-A PHARM. CO. LTD.

· 인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr
· 수신자부담 고객센터 : 080-988-8889

문헌작성일 : 2011. 04. 28 (Rev.0)