

진해거담제

인테스 캡슐 200mg

Intes Cap. 200mg

【성상】 백색의 원인이 든 상·하부 연청색의 캡슐제

【성분·함량】 1캡슐 중 아세틸시스테인(USP).....200mg

【효능·효과】

1. 주요효능 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담배출 곤란 : 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성 기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 만성염증
- 2) 인·후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

【용법·용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여한다.

1. 급성질환 - 성인 : 1회 200mg 1일 3회 · 소아 : 6-14세 1회 200mg 1일 2회
2. 만성질환 - 성인 : 1회 200mg 1일 2회 · 소아 : 6-14세 1회 100mg 1일 3회
3. 만성염증증 - 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2-5세 1회 100mg 1일 4회

연령·증상에 따라 적절히 조정한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 : 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케토노증 환자에는 투여하지 않는다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약에 과민증 환자

2) 위·십이지장궤양 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 신생아중증질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않는다.)

4. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식환자) 등이 나타날 수 있다.
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있다.

5. 상호작용 : 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치임페나잘)과 병용 투여 시 형성물질의 약효를 감소시킬 수 있다. (적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다.)

6. 임부에 대한 투여 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

7. 수유부에 대한 투여 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

8. 적용상의 주의 : 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1-30℃)

【포장단위】 30, 500캡슐

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 제정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://www.skynewpharm.com>이나 031314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

무안작성일 : 2008. 3. 5 (Rev.0)



주) 스카이뉴팜
경기도 시흥시 대야동 418-21

