

광범위 진균 무좀치료제

나미솔 크림

-테르비나핀염산염-



일반의약품

분류번호:265

사용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

무좀은 곰팡이의 일종인 백선균이 피부각질층에 기생하여 발생하는 가장 흔한 피부진균(곰팡이)감염증으로 수포(물집), 농포(고름물집), 가려움증, 통증 등 참기 어려운 다양한 증상을 수반하는 질환입니다.

나미솔크림의 주성분인 테르비나핀염산염(Terbinafine HCl)은 무좀균의 세포막 형성을 억제하여 진균자체를 죽이는 살진균 작용을 하여 무좀, 고부백선(대퇴부백선), 체부백선, 어루러기, 피부칸디다증을 효과적으로 개선시켜 줍니다.

● **원료약품 및 그 분량 : 1 g 중**

테르비나핀염산염(TP)(테르비나핀으로서 8.888 mg) 10 mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1 mg
파라옥시벤조산프로필 1 mg

● **성 상 : 흰색의 크림제**

● **효능 · 효과**

1. Trichophyton (T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

● **용법 · 용량**

1일 1~2 회 환부(질환 부위)에 바른다.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같다.

1. 족부백선(무좀) : 1~4 주
지간(손, 발가락 사이)형 족부백선(무좀) : 1 일 2 회 1 주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선) : 1~2 주
3. 피부칸디다증 : 1~2 주
4. 어루러기 : 2 주
치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

● **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 3) 유 · 소아



경남제약|주
Kyung Nam Pharm.Co.,Ltd.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리(벗겨짐), 자통(찌르는 것 같은 아픔), 작열감(화끈감)이 적용부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

4. 일반적주의

- 1) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
- 3) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.
- 4) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 않는다.
- 5) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(갓난아기)(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물에 대한 생식독성실험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대해 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 이 약을 소아에 투여하지 않는다.
(유 · 소아에 대한 사용경험이 적다)

7. 과량투여시의 처치

실수로 이 약을 복용한 경우에는 위세척 등의 적절한 처치를 한다.

8. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
- 2) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않는다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
- 3) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 않는다.

9. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

10. 기타

모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **포장단위** : 자사포장단위(외부포장에 표기)

● **제 조 자** : 한국글머(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

● **제조외자** : 경남제약(주) 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 49

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
 2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하시기 바랍니다.
 3. 이 약은 외용으로만 적용하시고 내복은 금하시기 바랍니다.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 “소비자분쟁 해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약도서관 「<http://drug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.