

## 티로드정

(티로프라미드염산염)



## 티로드정

티로프라미드염산염

## I 성분·함량 : 이 약 1정 중

- 유효성분 : 티로프라미드염산염(별규) ————— 100 mg
- 기타 첨가제 : 경질무수구산, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈크, 포비돈K30, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

## I 성 상 : 흰색의 원형 필름코팅정

## I 효능·효과

1. 다음 질환에서의 급성 경련성 동통 : 간담도산통, 여러 원인에 의한 복부산통, 신장·요관의 산통
2. 다음 질환에서의 복부 경련 및 동통 : 위장관 이상 운동증, 담석증, 담낭염, 수술 후 유착

## I 용법·용량

성인 : 티로프라미드염산염으로서 1회 100 mg 1일 2~3회 경구투여합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

## I 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
  - 1) 외부 자극으로 인해 위장관이 협착된 환자
  - 2) 거대 결장, 허탈 환자
  - 3) 이 약에 과민증 환자
  - 4) 중증의 간부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.  
항콜린작용을 나타내지 않지만 녹내장 또는 전립선 비대 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 이상반응
  - 1) 구갈, 구역, 구토, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
  - 2) 가려움, 홍반 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
4. 상호작용  
혈압강하작용을 투여받는 환자에게 이 약을 고용량 투여할 경우에는 혈압강하효과가 상승될 수 있으므로 주의합니다.

## 5. 임부에 대한 투여

동물실험에서 임부나 태아에 대한 이상반응을 나타내지는 않았으나 임부에의 사용은 필요성이 인정되는 경우로 제한하고 의사의 감독하에 투여합니다.

## 6. 보관 및 취급상의 주의사항.

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의합니다.

## I 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

## I 사용기한 : 외부포장참조

## I 포장단위 : 30정/병, 200정/병

※ 본 의약품은 KGMF의약품제조 및 품질관리기준(직역업체에서 생산하여 일련한 품질 관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.danagen.com](http://www.danagen.com))에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보 시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)의약품 정보란 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약물안전관리원 (1644-6223) • 작성일자 : 2020. 08. 17.

※ 제품 및 기타 문의 : 070-4327-0447

I 제조원

Daewon® 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

I 판매원

(주)다나젠

서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 15층 1501~1503호