

의약품 분류번호

265

나무줄크림

테르비나핀염산염 10 mg

원료약품 및 그 분량

- 1g 중
- 유효성분 : 테르비나핀염산염(JP).....10mg(테르비나핀으로서 8.888mg)
 - 첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....1.8mg, 파라옥시벤조산프로필(KP).....0.2mg
 - 기타첨가제 : 경질유동파라핀, 모노스테아린산소르비탄, 부틸레이티드히드록시톨루엔, 수산화나트륨, 스테아릴알코올, 정제수, 폴리소르베이트60, 프로필렌글리콜

성상

흰색의 크림제

약리작용 및 특징

- 직접적인 이중 살균효과 : 나무줄 크림은 allyamine 유도체로서 Squalene epoxidase에 선택적으로 작용하여 곰팡이의 ergosterol 생합성을 억제하고 세포 내 Squalene의 축적을 초래하여 피부사상균, 곰팡이 등에는 살진균 작용, 효모균에 대해서는 균주에 따라 살진균 또는 정진균 작용을 나타내는 광범위 무증 치료제입니다.
- 강력한 항진균 작용 : 지질과의 친화성이 높으므로 한번 바르면 최소 72시간 동안 약효가 지속되므로 치료 효과가 우수합니다.
- 안전한 항진균 작용 : 국소 부위에 바르는 경우 체내 흡수율이 5% 미만이므로 전신으로 약물이 거의 옮겨 가지 않아 전신 부작용을 일으키지 않는 안전한 무증 치료제입니다.

효능·효과

- Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균감염증 : 족부백선, 고부 백선(완선), 체부백선
- Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기
- 피부칸디다증

용법·용량

- 1일 1~2회 환부(질환부위)에 바른다. 질환에 따른 치료기간은 다음과 같다.
- 족부백선 : 1일 1회, 1주

지간형(발가락사이) 족부백선 : 1일 2회 1주

족저형(발바닥) 족부백선 : 1일 2회, 2주
 - 체부백선, 고부백선 : 1~2주
 - 피부칸디다증 : 1~2주
 - 어루러기 : 2주
- 치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 소아

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
 - 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
 - 피부의 두드러기, 발적, 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리, 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통(刺痛), 작열감이 적용부위에 나타나는 경우
- 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
 - 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.
 - 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.
 - 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.
 - 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 약용탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법을 실시할 것.
 - 이 약은 외용으로만 적용할 것.
 - 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균 감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.
 - 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 말 것.
 - 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

포장단위

15g/튜브

저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

첨부문서 시행일자

2020. 08. 18
- 이 첨부문서 시행일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.jw-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·파괴 또는 오손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.
연락처 : 고객만족팀 1588-4675 / 080-090-6777(수신자부담)
- 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.