

일반의약품
분류번호: 02220

아코라마 캡슐200mg (아세틸시스테인)

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

KGMP
적격업체제품

지속성 거담제(가래약) 아코라마 캡슐200mg (아세틸시스테인)

일반의약품
분류번호: 02220

아코라마캡슐200밀리그램은 Acetylcysteine 제제로서 아미노산의 일종인 L-cysteine의 N-Acetyl 유도체로서 폐·기관지 질환에 흔히 나타나는 끈끈한 기도 점액 물질로 인한 기도 폐쇄의 위험성을 감소시켜주고 기도 점액 물질의 과잉 축적으로 인한 각종 병리 증상을 완화시켜주는 객담 용해성 거담제로서 상기도와 연결된 내이(internal ear) 및 비강점막 감염성 질환에도 매우 유효하며 상기도 감염의 휴유증으로 오는 급·만성 비염(코염) 및 중이염 등의 예방과 치료에 매우 탁월한 제제입니다.

■원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

주성분 : 아세틸시스테인(KP) 200mg

첨가제(타르색소) : 황색203호, 녹색3호

동물유래성분 : 유당수화물(KP)/기원동물 : 소/사용부위 : 유유

■성상 : 흰색 내지 미황색(연노랑)의 가루가 충전된 상·하 녹색의 경질캡슐재

■효능·효과

다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 낭성성유증

■용법·용량

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1. 급성질환

성인 : 1회 200mg(1캡슐) 1일 3회

소아 : 6 ~ 14세 1회 200mg(1캡슐) 1일 2회

2. 만성질환

성인 : 1회 200mg(1캡슐) 1일 2회

소아 : 6 ~ 14세 1회 100mg(½캡슐) 1일 3회

3. 낭성성유증

소아 : 6세 이상 1회 200mg(1캡슐) 1일 3회



삼남제약(주)

KGMP공장 : 충청남도 금산군 금산읍 인삼로 77

소비자 상담창구 : 041-754-3771

■사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2) 위·십이지장궤양 환자

3) 2세 미만 영아(젖먹이, 갓난아기)

4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

2) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등

2) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식 환자) 등

3) 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압

4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989 ~ 2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

· 호흡곤란

4. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치암페니콜)과 함께 복용시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다).

2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

■저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용기한 : 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

■포장단위 : 자사포장단위

※ 이 문안은 2016년 04월 18일자로 작성되었으며 이후 변경된 내용은 www.samnam51.com이나 041-754-3771에서 확인할 수 있음.

※ 만약 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국·병원개설자에 한하여 분사 또는 영입소를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.