

위산과다 · 위염 · 속쓰림에 ...

세란드정 (알마게이트)

SELAND® Tab.(Almagate)

KGMP
적격업체제품

일반의약품
분류번호 234

세란드®정은 제산작용과 항펩신작용 및 담즙(쓸개즙)산 흡착 · 중화작용의 3중작용을 겸비한 알마게이트를 주성분으로 하는 위장약입니다.

세란드®정은 과다 분비된 위산을 중화하여 위내의 pH를 정상화하고, 과알칼리화나 산반동(위산과다 분비)을 일으키지 않으면서 제산작용을 나타내므로 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림 등 위장질환으로 인한 증상을 개선합니다. 또한 세란드정은 위염과 궤양을 유발하고 악화시키는 담즙(쓸개즙)산 흡착 · 중화하고 펩신의 활성을 합리적으로 조절함으로써 항궤양 작용을 나타내므로 위 · 십이지장 궤양, 위염, 위산과다, 역류성식도염 등의 위장질환으로 인한 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림 등의 증상을 개선하는 효과적인 위장약입니다.

▶ **원료약품의 분량** : 1정 중

알마게이트(KP)500mg

▶ **성 상** : 백색의 원형정제

▶ **효능 · 효과**

다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위 · 십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림

▶ **용법 · 용량**

성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분~1시간에 씹어서 경구 복용한다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있다.

▶ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자
- 2) 알츠하이머병 환자
- 3) 치질 환자
- 4) 체액 저류(부기) 환자
- 5) 임신 중독증 환자
- 6) 설사 환자
- 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

테트라사이클린계 항생물질함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 흡착작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수 · 배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용한다.
(1) 비스테로이드소염진통제(NSAD), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2~3시간 간격을 두고 복용한다.

(2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킨다.

2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 공팔에 축적될 수 있다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않는다.

3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있음.

4) 고령자

5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사
- 2) 2주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것
- 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

▶ **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

▶ **보험등록번호** : 647801190

▶ **포장단위** : 100, 500정

※ 주의

1. 의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
2. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용하지 마십시오.
3. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

※ 만약 구입시 사용기한 또는 유효기간이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부서 작성일자(2015년 11월 25일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화080-082-1234)을 통해 알 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따라 표기되어 있습니다.

제조판매원

SAMJIN

삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우산로 121 (서교동)

공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52

☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6