

코감기·비염(코염) 엑티리딘 정

코막힘·재채기·콧물

원료약품 및 그 분량 (1정 중)

- 유효성분 : 슈도에페드린염산염(USP) 60.0mg
트리프롤리딘염산염수화물(USP) 2.5mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탭실드린색(21W002)

성상

흰색의 원형의 필름코팅정제

효능·효과

코감기, 알레르기 및 혈관운동성 코염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

용법·용량

성인 : 1회 1정, 소아(12~14세) : 1회 1/2정
1일 3회 식후에 복용하십시오.

사용상의 주의사항

1.경고

- 1) 슈도에페드린 함유 의약품 복용 시 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP)과 같은 중증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민반응 병력이 있는 환자
- 2) 중증(심한 증상)의 간 및 신기능 장애 환자
- 3) 중증(심한 증상)의 관상 심장 질환 환자
- 4) 잔뇨 형성을 수반하는 배뇨(소변을 누)장애 환자
- 5) 고혈압 및 관상동맥(심장동맥)질환 환자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 2세 이하의 영아(갓난아기)
- 8) MAO 억제제를 투여중인 환자
- 9) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 - 갈락토오스(gulucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 혈압강화제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO 억제제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울약, 구아네티딘, 브레틸리움, 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(충혈제거제, 식욕억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제(억제제)와 병용(함께 복용(사용))투여하지 않습니다.
- 2) MAO억제제의 긴 작용시간 때문에 MAO억제제 투여 최소 15일 후 이 약을 투여하십시오.

일반의약품

KGMP 적격업체

2306-15

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 이 약의 투여 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 주의하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 천식 환자
- 2) 녹내장 환자
- 3) 심질환 및 부정맥 환자
- 4) 당뇨병, 갑상샘기능항진증 환자
- 5) 전립샘비대로 인한 배뇨(소변을 누)곤란 환자
- 6) 12세 미만의 소아

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 경우
- 2) 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한(땀이 남), 경미한(가벼운) 혈압강하, 시력장애, 산동(동공 확대), 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직(굳음), 아테토시스, 간대상 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비 등의 중추신경계 이상이 나타날 경우
- 3) 피부반응, 일시적인 자극통, 작열감(화끈감) 등의 과민반응이 나타날 경우
- 4) 구갈(목마름), 구역, 구토 등의 소화기계 이상이 나타날 경우
- 5) 배뇨(소변을 누)곤란 등의 이상이 나타날 경우
- 6) 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.
- 7) 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP), 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물집)와 같은 중증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 경우
- 8) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배아픔), 직장 출혈 등)이 발현(드러냄)될 경우

7. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.

- 1) 과량투여 시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용합니다. 슈도에페드린 제거에는 투석하도록 합니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

10정

취급상의 주의사항

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 개정일자(2023년 06월 19일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 ‘의약품검색’ 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

[제조자의지] (주)에이프로젠바이오로직스/경기도 화성시 양감면 두마리길 16

[제조자] (주)마더스제약/전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 38 마더스제약 제2공장

[판매자] (주)대웅생명과학