

[성상] 백색의 원형 필름코팅제

[용법·용량] 성인: 클로닉신리신으로서 1회 125~250밀리그램 1일 3회 경구투여한다(먹는다, 복용한다).

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[효능·효과] 다음 질환에 사용할 수 있습니다.

류마티양 관절염, 근육통, 신경통, 외상(상처)후, 수술후, 동통(통증), 두통, 치통, 이통(귀통증), 월경통

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관



일반의약품

분류번호:01140

Human Healthcare Group
KWANGDONG PHARM.

효과빠른 소염진통제 클리네 정 (클로닉신리신)

· 과민성 ·
· 그외 ·
· 신경통 ·
· 치통 ·
· 생리통 ·

10정



광동제약(주)

[판매처] 광동제약(주) 경기도 평택시 모곡동 440-2

[제조회사] 주녹스팜코리아 충북 진천군 문백면 장월리 112-3

[제조자] 청계제약(주) 경기도 화성시 양감면 대양리 1106-4

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 등 정보」를 참조하세요.

※ 이 약을 사용하기 전 제품설명서를 꼭 읽어보시고, 첨부된 제품설명서는 반드시 본 의약품과 함께 보관하십시오.

[성분·함량] 1정 중

클로닉신리신(KPC) 125mg

동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)

[사용상의 주의사항] 첨부문서 참조

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2) 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 중대한 심혈관계 혈전(혈관막힘)반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수도 있다.

3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염(항염)진통제는 위 또는 장관(창자)의 출혈, 궤양 및 천공(뚫림)을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자(노인)는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 소화성궤양 환자 2) 약물에 기인하여 위·십이지장에 동요(안절부절) 발현(드러냄, 드러내 보임)시 3) 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자 4) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염(항염)진통제(COX-2 저해제(억제제) 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자 5) 관상동맥(심장동맥) 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료 6) 임부 7) 갈락토오스 불내성, Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 소화성궤양의 병력이 있는 환자 2) 임부 3) 수유부 4) 소아 및 고령자(노인) 4) 이상반응

1) 소화기계: 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공(뚫림)이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. 2) 기타: 때때로 구역, 구토, 현기증(어지러움), 졸음, 두통, 식은땀, 현기, 다형성이상형백반이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의 6. 상호작용 7. 보관 및 취급상의 주의사항: 첨부문서 참조