

※ 복용전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

정부공인 KGMP  
적격업체제품

일반의약품  
분류번호 : 264



신속하고 강력한 소염진통효과

**스팅겔**

디클로페낙나트륨



스팅겔은 소염(항염)·진통 성분이 액체에 녹아 들어있는 상태로써 실온에서는 반고형상이지만 피부에 문질러 바르면 액체로 흡수되는 겔제제입니다. 스팅겔의 소염(항염)·진통성분인 디클로페낙나트륨은 이미 먹는약으로 널리 사용되고 있는 비스테로이드성 소염(항염)진통제로써 인대, 근육 및 관절의 염증에 우수한 효과를 발휘합니다. 서울제약 스팅겔은 이 소염(항염)진통제를 국소제제화 한 것으로 아픈 부위에 마사지하듯 발라줌으로써 전신이상반응을 피하면서 효과가 빠르게 나타나도록 하였습니다. 특히 끈적임이나 번들거림이 없고 발랐을 때 상쾌한 청량감이 바로 느껴져 사용감이 우수합니다.

■ 성분·함량 : 1g 중  
디클로페낙나트륨(KP) ..... 10mg  
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP) ..... 1.5mg  
파라옥시벤조산프로필(KP) ..... 0.5mg

■ 성 상 : 무색투명한 겔제

■ 효능·효과  
다음 질환 및 증상의 진통·소염(항염)  
1. 건(힘줄)·인대, 근육 및 관절의 외상성(상치) 염증(뻘, 타박상 등)  
2. 연조직 류마티스의 국소형(건초염(힘줄윤활막염), 어깨손증후군, 점액낭염, 관절주위염 등)  
3. 류마티스 질환의 국소형(말초관절 및 척추의 골관절염 등)

■ 용법·용량  
통증 부위의 면적에 따라 2~4g을 1일 3~4회 환부(질환부위)에 바르고 잘 스며들도록 가볍게 문지른다.

■ 사용상의 주의사항  
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것  
1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자  
2) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 과민증이 있는 환자  
3) 아스피린 또는 기타의 비스테로이드성 소염(항염)진통제에 대한 천식(비스테로이드성 소염(항염)진통제 등에 의한 천식 발작을 유발) 또는 그 병력이 있는 환자 (천식 발작을 일으킬 수 있다.)  
4) 6세 이하의 유아  
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것  
기관지 천식 환자(중증(심한증상) 천식발작을 일으킬 수 있다)  
3. 이상반응  
1) 때때로 가려움, 발적(충혈되어 붉어짐), 쓰라림, 피부염(발진, 습진, 피진(피부 발진), 구진, 접촉성 피부염, 부종(부기)), 피부박탈 및 거칠어짐, 자극감 및 수포형성, 드물게 색소침착이 나타날 수 있다. 특히 접촉성 피부염은 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 반점, 발진, 소양감(가려움), 동통(통증) 등이 나타나고 종창(부기), 부종(부기), 수포, 미란(긁무름) 등으로 악화될 수 있으며, 이와 같은 증상이 전신으로 확대될 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 즉시 사용을 중지하고 적절한 처치를 해야 한다.  
2) 넓은 부위에 또는 장기간 사용할 경우 범발성 피부발진, 광과민증, 호흡곤란, 천식, 맥관 부종(혈관부종) 등의 전신 이상반응이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의  
1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)임에 유의한다.  
2) 피부의 감염증을 불연성화(겔으로 드러나지 않게)할 우려가 있으므로 감염을 수반하는 염증에 대해 이 약을 사용하는 경우에는 적당한 항균제 또는 항진균(곰팡이)제를 병용(함께 사용)하고 충분히 관찰하여 신중히 투여한다.  
3) 만성질환(비행성관절염(골(뼈)관절염) 등)에 이 약을 사용하는 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려한다. 또 환자 상태를 충분히 관찰하고 이상반응 발현(드러냄)에 유의한다.  
4) 이 약 투여 2주 후에는 이 약에 대한 재검토가 이루어져야 한다.  
5. 임부 및 수유부에 대한 투여  
1) 임신 3기 : 프로스타글란딘 합성저해로 인해 출산이 지연될 수 있으며, 출산시 실험, 신생아 출혈, 태아의 심폐독성(폐동맥 고혈압)(동맥관 조기폐쇄를 수반하는 폐고혈압), 신기능 저하로 양수과소증을 수반하는 신부전 등이 나타날 수 있으므로 이 시기의 임부에게는 사용하지 않는다.  
2) 임신 1기 및 2기 : 동물의 생식실험 결과 태자독성은 발생하지 않았으나 임부에 대한 연구는 아직 밝혀진 바 없다.  
3) 영아(갓난 아기)에 대한 위해 여부는 아직 밝혀진 바 없으나 이 약이 모유로 이행하므로 수유부에게는 사용하지 않는다.  
6. 소아에 대한 투여  
소아에 대해서는 안전성이 확립되어 있지 않다.(사용경험이 적다)  
7. 과량투여시의 처치  
1) 증상 : 올바르게 사용하지 않거나 갑자기 과용량을 사용하여 저혈압, 신부전, 경련, 위장관(장자) 불쾌감 및 호흡기능 억제 등의 전신 이상반응이 나타날 수 있다.  
2) 처치 : 비스테로이드성 소염제(항염증제)의 일반 해독법을 사용한다. 이 처치법은 대증적(증상에 대응하여) 보조요법이다.  
8. 적용상의 주의  
1) 병변(병에 의한 몸의 변화)이 있는 피부(출혈성 피부질환, 습진, 감염된 병변(병에 의한 몸의 변화), 화상, 상처), 눈 및 점막부위에는 사용하지 않는다.  
2) 밀봉봉대법으로 사용하지 않는다.  
3) 피부에 손상이 있을 경우 사용하면 일시적인 자극 및 저린감을 일으킬 수 있으므로 사용시 주의한다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 50g

\* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
\* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.  
\* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 [www.seoulpharma.com](http://www.seoulpharma.com)이나(080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

최종작성일자 : 2011. 06. 07

■ 제 조 자 : 시믹씨엠오코리아(주) : 경기도 부천시 원미구 도당동 157-3

■ 제조의뢰자 : (주)서울제약 : 경기도 시흥시 정왕동 1248-8



마음까지 건강하게  
(주)서울제약  
경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지  
문의전화 : (080)780-1931