

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

참을수 없는 무좀에

나르비 크림 1%

(테르비나핀염산염)

NAREVI Cream 1%

나르비크림은 allylamine계 약물로서 낮은 농도에서도 피부사상균, 물드 등에 살진균(fungicidal)작용을 가지며, 효모균에 대해서도 균주에 따라 살진균 또는 정진균작용을 가지는 광범위 스펙트럼의 항진균(항곰팡이)제이다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

테르비나핀염산염(USP).....10mg

보존제: 벤질알코올(KP).....1.1mg

【성상】 백색의 크림제

【효능·효과】

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(발백선증, 무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선(사타구니백선)), 체부백선

2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기

3. 피부칸디다증

【용법·용량】

1일 1~2회 환부(질한 부위)에 바른다.

질한에 따른 치료기간은 다음과 같다.

1. 족부백선(발백선증, 무좀) : 1일 1회, 1주

지간(손, 발가락사이)형 족부백선(발백선증, 무좀) : 1일 2회 1주

족저형(발바닥) 족부백선(발백선증, 무좀) : 1일 2회, 2주

2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선) : 1~2주

3. 피부칸디다증 : 1~2주

4. 어루러기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

3) 소아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

상당시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우

2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우

3) 피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리(벗겨짐), 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통(刺痛)(찌르는 것 같은 아픔), 작열감(화끈함)이 적용부위에 나타나는 경우

K G M P

일반의약품

적격업체

분류번호:265

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.

2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.

3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.

4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신(온몸)적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(갓난아기)(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신(온몸)적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.

5) 실제로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법(증상별로 치료하는 방법)을 실시 할 것.

6) 이 약은 외용으로만 적용할 것.

7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실제로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균(곰팡이) 감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.

8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 말 것.

9) 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 15g / 튜브

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자 『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 사용가능한 의약품입니다.

※본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질·변해·오염되거나 손상된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이ذ리드)→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고에 알려주시기 바랍니다.

※ 제조자 : 태극제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

※ 제조의뢰자 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

☞ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일 : 2017년 06월 16일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr