

치조골(이틀 뼈)을 튼튼하게

덴큐[®]정

(옥수수불검화정량추출물)

일반의약품

분류
번호

231
(치과구강용약)

덴큐정은 옥수수불검화정량추출물로 치아지지조직[잇몸, 치조골(이틀 뼈) 등]에 작용하여 잇몸이 붓고 피가 나며 치아가 흔들리거나 만성적인 잇몸조직의 염증질환으로 치아지지골(뼈)조직이 파괴되는 것을 막아주어 잇몸을 튼튼하게 해줍니다.

원료약품의 분량 (1정중)

옥수수불검화정량추출물(KHP) (총 β -시토스테롤로서 7.0mg) 35.0mg
첨가제(타르색소) : 황색4호, 황색5호, 청색2호

성상

이 약은 주황색의 원형 필름코팅정입니다.

ID D

약리작용

1. 잇몸 염증을 막아주어 출혈을 예방해 줍니다.
2. 파괴된 치주(치아주위조직)인대를 재생시켜 치아가 흔들리는 것을 예방해 줍니다.
3. 치조골(이틀 뼈)을 강화시켜 치조골(이틀 뼈)이 용해되는(녹는) 것을 방지합니다.

효능·효과

치주(치아주위조직)질환 [치아 지지조직 질환, 치은염(잇몸염),
치주(치아주위조직)증(유년형 치주(치아주위조직)염)]

용법·용량

성인 : 초기량으로는 옥수수불검화정량추출물로서 1회 70mg(2정), 1일 3회 식전에 복용합니다.

유지량으로는 1회 35mg(1정), 1일 3회 식전에 복용합니다.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 아조계 색소류, 아세틸살리실산(아스피린) 또는 다른 Prostaglandin synthase 억제제 [비스테로이드성 소염제(항염증제)]에 과민반응이 있는 환자는 이 약의 사용에 신중을 기해야 합니다.
- 2) 이 약은 콜레스테롤류 약물(예: 스테로이드 호르몬제 등)의 흡수를 방해할 수 있으므로 주의합니다.
- 3) 임부 및 수유부(임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고(웃돈다고) 판단되는 경우에만 투여합니다.)
- 4) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
- 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 가벼운 완화작용(변을 부드럽게 보게 함)을 일으킬 수 있습니다.
- 2) 천식 또는 만성 두드러기가 있거나, 비스테로이드성 항염증제류에 과민반응을 보이는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 피부나 호흡기계에 과민반응을 유발할 수 있습니다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※제품 개봉 또는 취급시에 포장재(PTP, 케이스)로 인하여 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.
- ※포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품(알약)에 포장물(알루미늄호일지)이 같이 따라오는 경우가 있으므로 복용시 정제(알약)만 복용하십시오.
- ※개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오. 습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

포장단위

60, 100, 120, 200, 240, 360, 400정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 4월 7일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

ILDONG 일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2

공장: 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030411-1150407

