



엘프라이드정

(레보설퍼리드)



전문의약품	분류번호	239(기타의 소화기관용약)
-------	------	-----------------

엘프라이드정은 중추 및 말초 D₂수용체를 선택적으로 차단하여 위장관 운동을 촉진시키고 허부식도 괄약근압을 높여서 기능성 소화불량으로 인한 여러 가지 증상을 개선시킵니다. Sulpiride의 L-isomer인 엘프라이드정은 활성형으로 racemic형보다 3~8배 정도 작용이 강하며 D₂수용체에 대한 선택성이 크므로 용량을 감소시킬 수 있으며 부작용도 적어 안전성이 높습니다.

원료약품의 분량(1정중)

레보설퍼리드(KP) 25.0mg

성상

이 약은 백색의 원형정제입니다.



약리작용

1. 위장관 운동 정상화

위장관의 장근 신경충에 작용하여 위장관 운동을 촉진시켜 저하된 위 배출능을 개선시켜주고, 식후 포만감, 식후 불쾌감, 구역, 오심, 구토, 트림, 식후 상복부 통증, 식욕부진 등의 전반적인 소화불량 증상들을 개선시킵니다.

2. 허부식도 괄약근압을 증가

허부식도 괄약근의 D₂수용체를 선택적으로 차단하여 허부식도 괄약근압을 증가시켜 가슴쓰림, 가슴 앓이(hurt-burn), 역류성 위식도염에 효과적입니다.

3. 구토와 오심을 억제

장근 신경충뿐만 아니라 중추신경계 CTZ(chemoreceptor trigger zone)의 D₂수용체를 선택적으로 차단하여 오심과 구토억제에 탁월한 효과를 보입니다. 또한, 항암제 치료 중이거나 수술후 나타나는 구토와 오심에 효과적입니다.

효능·효과

기능성소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 :

복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

용법·용량

성인 : 레보설퍼리드로서 1회 25mg을 1일 3회 식전에 경구투여합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 위장관운동자극이 유해한 환자(예, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자)
- 코롭친화세포종 환자(종양으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있습니다.)
- 이 약에 과민반응이 있거나 불내성인 환자
- 간질환자, 조병 상태 및 조울병의 조병단계의 환자
- 약성유선병증 환자(대부분의 항정신성 의약품이 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방 형성 장애간에 상호관련성이 있다고 여겨집니다.)

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 고혈압 환자
- 소아(추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의하십시오.)
- 고령자

3. 이상반응

- 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비기능조절이상(성선자극호르몬 분비 및 프로락틴분비 이상)에 기인한다고 추정되는 무월경, 유즙분비과다, 여성형유방증이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지합니다.
- 추체외로계 : 드물게 진전, 허의 꼬임, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지합니다.
- 지연이상운동(tardive dyskinesia) : 장기투여에 의해서 드물게 입주위 등에 불수의 운동이 나타나서 약물투여를 중지한 후에도 지속되는 수가 있습니다.
- 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있습니다.
- 순환기계 : 고혈압, 부정맥
- 신경이원제약성증후군(Neuroleptic Malignant Syndrome) : 이 약을 항정신병 치료과정에서 신경이원제로 투여하는 중에 신경이원제 약성증후군이 보고된 바 있습니다. 이와 관련된 증상으로는 고열, 근육강직, 운동불능, 자율신경계 장애(불규칙한 맥박과 혈압, 발한, 빈맥, 부정맥), 무감각 또는 혼수상태로 발전가능한 의식상태의 변화 등이 있는데 이러한 증상이 나타날 경우, 가급적 이 약을 비롯한 항정신병 약물의 투여를 즉시 중단하고 체온강하 수분공급 등 집중적인 대증요법을 실시합니다. 이러한 증상의 발현시에는 백혈구 증가, 혈청 크레아티닌아제(CK) 상승이 자주 나타나고 미오글로빈뇨증을 수반한 신기능저하가 나타날 수 있습니다. 신경이원제약성증후군 환자가 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환하탈과 탈수증상, 급성 신부전으로 발전되어 사망했다는 보고도 있습니다.
- 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지합니다. 또한 때때로 화끈감, 권태감, 불면, 졸음, 어지럼, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 발기부전이 나타날 수 있습니다.
- 장기투여의 경우 무월경, 여성형유방증, 유즙분비과다, 성욕의 증감 등의 이상반응이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이원제들과 유사하게 시상하부 뇌하수체 생식선 제2경추의 기능에 대한 효과로서 가역적입니다.

4. 일반적 주의

- 간뇌의 내분비기능조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙누출의 이상반응이 있으므로 처방 전 반드시 환자에게 주지시킵니다.
- 간뇌의 내분비기능조절이상, 추체외로 증상 등의 이상반응을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여합니다.
- 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야 하는 기계조작을 피하는 것이 바람직합니다.

4) 고용량의 레보설피리드 제제는 일부 해외 국가에서 비정형 항정신병 치료제 (atypical neuroleptics)로서 처방되고 있습니다. 동일한 계열의 비정형 항정신병약에서 드물게 QT연장, 심실부정맥(예, Torsades de Pointes), 심실성 빈맥, 심실세동, 심장 정지가 관찰된 바 있으며 이러한 심장의 이상은 매우 드물게 사망을 초래할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 또한 비정형 항정신병약을 복용하고 있는 고령의 치매환자를 대상으로 한 임상시험의 결과, 항정신병약의 복용은 위약 대비 뇌혈관 사건을 약 3배 증가시키는 것으로 관찰되었습니다. 이러한 이상반응의 매커니즘은 아직 알려져 있지 않고 다른 항정신병약, 다른 환자군에서의 위험 증가를 배제할 수 없으므로 뇌졸중 위험요소를 지닌 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 반드시 허가상의 용법, 용량에 따라 신중히 투여해야 합니다.

5. 상호작용

- 1) 위장관운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린효능약(아트로핀, 메틸스코폴라민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용투여 하지 않습니다.
- 2) 디기탈리스제제 포화시의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성화 할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여합니다.
- 3) 다른 벤즈아미드계 약물(메토클로프라마이드, 티아프리드 등)과의 병용에 의한 내분비기능이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여합니다.
- 4) 정신약리학적 약물과의 병용투여 시 상호작용에 기인한 예기치 않은 이상반응이 나타날 수 있으므로 특별히 주의하여야 하며 알코올과 동시투여하지 않습니다.
- 5) 이 약을 QT 간격을 연장시키는 약물과 병용투여 시 심장부정맥의 위험성이 증가되므로 병용하는 경우에는 충분한 주의와 관찰이 필요합니다.
- 6) 전해질 장애를 일으키는 약물과 병용투여하지 않습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

동물실험에서 태자에 대한 기형발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않습니다.
신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 여성에게는 투여하지 않습니다.

7. 고령자에 대한 투여

주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 부작용(추체외로 증상 등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여합니다.

8. 기타

- 1) 진토작용으로 다른 약에 기인하는 중독, 장폐색, 뇌종양에 의한 구토증상이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여합니다.
- 2) 동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있습니다.
- 3) 랫 및 마우스에 고용량을 장기간 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양발생빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있습니다.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

30정, 300정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2015년 4월 9일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : 신풍제약
경기도 안산시 단원구 원시로 7

제조의뢰자 :

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우로27길 2

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)