

유로솔액

Urosol Irrigation

●원료약품 및 그 분량

이 약 100밀리리터 중	
주성분 : 디-소르비톨(약전)	2.7그램
디-만니톨(약전)	0.54그램
용 제 : 주사용수(약전)	적량

●성상

외부를 반투명의 고밀도 폴리에틸렌으로 포장한 무색투명한 수액용 플라스틱 용기에 충전된 무색투명한 관주액.

●효능·효과

전립선 및 방광질환의 경요도적 수술시, 방광경 검사시, 기타 비뇨기와 수술시 및 수술 후의 세정

●용법·용량

경요도적으로 방광 및 요도를 세정한다.
의사의 처방 또는 지시에 따라 사용한다.

●사용상의 주의사항

- 다음 환자에게 사용하지 않것.
무뇨증 환자(체액량이 과잉 상태인 경우)
- 다음 환자에는 신중히 사용할 것.
1) 신장질환 환자
(세포외액의 증가로 순환체에 과부하를 줄 수 있다.)
2) 신부전증 환자
(이 액의 이뇨작용에 의해 병증이 악화될 수 있다.)
- 이상반응
1) 체액, 전해질이상 : 혈청삼투압 저하, 저나트륨혈증 등의 증상이 나타날 수 있다.
2) 혈액계 : 혈액색혈증이 나타날 수 있다.
3) 순환기계 : 노린맥(서맥), 수축기압의 상승, 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있다.
4) 정신신경계 : 불안, 착란 등의 증상이 나타날 수 있다.
5) 기타 : 흉부불쾌감, 과다호흡이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
요도절제술(TUR)중 생체내에 흡수되면 체액이 희석되어 저나트륨혈증 등의 전해질 불균형이나 혈액색혈증을 일으킬 수 있으므로 관류량의 출입, 환자의 전신상태 등을 충분히 관찰한 후 사용하고

- 필요시 전해질 보급을 하는 등 적절한 처치를 한다.
- 적용상의 주의
1) 조제시 : 희석으로 인해 방부효과가 저하되므로 용시 조제하고 잔액은 보관하지 않는다.
2) 투여시 : 주사용으로 사용하지 않는다.

●저장방법

밀봉용기, 실온보관(1~30℃)


●포장단위

- 1, 3, 5리터
- * 본 제품은 '우수의약품 제조관리 기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 위한 의약품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나, 변질·변패, 오염 되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 문의하실 사항이 있으신 분은 아래의 전화로 연락바랍니다.
 - * 수액세트 스파이크 삽입 또는 액물 추가 혼주시 고무주사 파편이 생길 우려가 있으므로 주의가 필요합니다.
 - * 오버 파우치 제거후 즉시 사용을 권장합니다.
 - * 육안으로 보이는 이물이 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
 - * 냉동 및 가열 금지
 - * 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
 - * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → (의약품유해사례보고)에 알려십시오.
 - * 이 첨부문서 개정일자(2014년 05월 01일) 이후 변경된 내용은 <http://www.cjp.co.kr>에서 확인할 수 있습니다.


설명서 작성연월일: 920813
설명서 개정연월일: 140501

제조사 : 씨제이헬스케어주식회사
충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20
고객행복센터 : 080-700-8802


■Safe-Flex® 용기의 사용방법




1 Safe-Flex 용기의 뒷부분을 원손으로 고정시킨 다음, 오른손 엄지로 길라진 부분을 잡고 오른팔을 아래쪽으로 밀어 내리면서 (몸과 수직방향) 결포장을 제거합니다.




3 푸른색 보호막을 돌려서 제거합니다.




5 주입중 눈금을 확인하는 경우에는 정면에서 눈금을 읽을 수 있으며 이 경우 오차의 범위는 $\pm 5\%$ 이내입니다.



2 제품의 이상여부를 확인한 다음, 약제를 추가하는 경우에는 노란 고무막으로 덮혀있는 입구에 19~22gauge 주사바늘을 사용하여 약제를 주입하여 5~6회 주입해도 무방합니다.



4 수액세트의 스파이크를 우측으로 돌려서 삽입합니다.



6 주입이 종료된 후에는 빈 용기를 소각하거나 수거박스에 넣어 수거업자가 회수토록 합니다.