

레비드® 정

(레보설퍼리드)

【원료약품 및 그 분량】1정 중

레보셀피리드(K.P).....25.0mg

동물유래성분 : 유당수화물(소, 우유), 스테아르산마그네슘(소, 우지)

【성상】 백색의 원형정제

【효능·효과】 기능성 소화불량으로 인한 다음 증상의 완화 - 복부팽만감, 상복부불쾌감, 속쓰림, 트림, 구역, 구토

【附・考】

성인 : 레보설퍼리드로서 1회 25mg을 1일 3회 식전에 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 2) 위장관운동지체가 유해한 환자(예, 위장관 출혈, 기계적인 장애 또는 천공이 있는 환자)
- 3) 콜론천화세포 종양 환자(증상으로 인해 카테콜아민 방출에 기인한 고혈압을 유발할 수 있음)
- 4) 이 약에 과민반응이 있거나 불내성인 환자
- 5) 간질 환자, 조영 상태 및 조영제의 조영제인 환자
- 6) 악성유방선종 환자(대부분의 항암성선의 약효를 가지고 있는 프로락틴 과분비 효과와 유방 형성 장애간에 상호관련성이 있다고 여겨진다.)
- 7) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 결함이 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 소아(추체외로 증상이 발생되기 쉬우므로 과량 투여하지 않도록 주의할 것.)
- 3) 고령자

3. 이상반응

- 1) 내분비계 : 때때로 간뇌의 내분비기능조절이상(성선자극호르몬 분비 및 프로락틴분비 이상)에 기인한 경우로 추정되는 무월경, 유즙분비과다, 여성형유방증이나 다낭성 수 있으며 종종 불면과 관찰하고 이상이 나타나면 즉시 투약을 중지한다.
- 2) 추체외로계 : 드물게 진전, 허의 꼬임, 초조감 등이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투약을 중지한다.
- 3) 지연이성운동(tardive dyskinesia) : 장기투여에 의해 지속적 드물게 입위 등 불수의 운동이나 무의식적 약물투여를 증가하는 유예도 발생할 수 있다.
- 4) 소화기계 : 때때로 구갈, 속쓰림, 구역, 구토, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 5) 순환기계 : 고혈압, 부정맥
- 6) 신경이완장애성증후군(Neuroleptic Malignant Syndrome) : 이 약을 항정신병 치료과정에서 신경이완제로 투여하는 중에 신경이완제 과사용증상이 보고된 바 있다. 이와 관련된 증상으로는 고열, 근육강직, 운동불능, 자율신경계 장애(불규칙한 맥박과 혈압, 발한, 빈맥, 부정맥), 무감각 또는 혼수상태로 발전가 능한 의식상태의 변화 등이 있는데 이러한 증상이 나타나면 경구, 구급적 약을 투여한 후 병원에 입원하여 투약의 여부를 즉시 중단하고 체온강하, 수분공급 등 즉 중적인 대증요법을 실시한다. 이러한 증상의 발현시에는 백혈구 증가, 혈청 크레아티닌치(CK) 상승이 자주 나타나고 미오글로빈뇨증상을 수반한 신 기능저하가 나타날 수 있다. 증상이 지속되어약사용중 환자가 고열이 지속되고 의식장애, 호흡곤란, 순환허탈과 탈수증상, 급성 신부전으로 발전되어 사망 할 때는 보고도 있다.
- 7) 기타 : 드물게 발진, 부종이 나타날 수 있으며 이와 같은 경우에는 약물투여를 중지한다. 또한 때때로 화끈감, 권태감, 불면, 졸음, 어지럼, 비틀거림이 나타날 수 있고 드물게 발기부전이 나타날 수 있다.
- 8) 장기투여의 경우 무월경, 여성형유방증, 유즙분비과다, 성욕의 증감 등의 이상반응이 나타날 수 있는데 이는 다른 신경이완제들과 유사하게 사상하부 뇌하수체 성선성 제2경로의 기능에 대한 효과로서 가역적이다.

4. 일반적 주의

- 1) 가난의 내분비기능조절이상으로 인해 프로락틴의 분비가 증가하고 유즙은

출의 이상반응이 있으므로 처방 전 반드시 환자에게 주지시키다.

- 2) 간뇌의 내분비기능조절시스템, 체류로브 증상 등의 이상반응을 일으킬 수 있으므로 유효성과 안전성을 충분히 고려하여 투여한다.
- 3) 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 및 주의를 집중해야 하는 기계조작을 피하는 것이 바람직하다.
- 4) 고령의 레보도파아이드 제제는 일부 해외 국가에서 비정형 항정신병 치료제(atypical neuroleptics)로서 처방되고 있다. 동일한 계열의 비정형 항정신병 약에서 드물게 QT간격, 심실부정맥(예, Torsades de Pointes), 심장성 빈맥 심실세동, 심장 정지과 관련될 바 있으며 이러한 증상의 이상은 매우 드물게 사망을 초래할 수 있으므로 주의가 필요하다. 또한 비정형 항정신병약을 복용하고 있는 이 경우의 치매환자는 대상으로 한 임상시험의 결과, 항정신병약의 복용은 위약 대비 뇌혈관 사건을 약 3배 증가시키는 것으로 관찰되었다. 이러한 이상반응의 메커니즘은 아직 알려져 있지 않고 다른 항정신병약, 다른 환자군에서의 위험 증가를 배제할 수 있으므로 뇌졸중 위험요소를 지닌 환자들에게 이 약을 투여할 경우에는 반드시 허가상의 용법, 용량에 따라 신중히 투여해야 한다.

5. 상호작용

- 1) 위장관운동에 대한 이 약의 효과는 항콜린효능성(아트로핀, 메틸스코폴라민 등), 마약 및 진통제에 의해 길항적으로 나타날 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
 - 2) 디기탈리스제제 호파신의 지표인 구역, 구토, 식욕부진 증상을 불현성과 할 수 있으므로 디기탈리스제제를 투여받고 있는 환자에서는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
 - 3) 다른 전해질대체 약물(메토클로프라미드, 티아프리드 등)과의 병용에 의한 내분비계이상성 또는 추체의도 증상이 발현되나 쉬우므로 이것들을 병용하는 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
 - 4) 정신인식학적 약물과의 병용투여 시 상호작용에 기인한 예지치 않은 이상반응이 나타날 수 있으므로 특별히 주의하여야 하며 알고율과 동시투여하지 않는다.
 - 5) 이 약을 QT 간격을 연장시키는 약물과 병용투여 시 심장부정맥의 위험성이 증가되므로 병용하는 경우에는 충분한 주의와 관찰이 필요하다.
 - 6) 전혈액 정맥을 일으키는 약물과 병용투여하지 않는다.
- 6. 임부 및 수유부에 대한 투여** - 동물실험에서 태자에 대한 기형발생의 위험이 있는 것으로 보고되어 있으며, 임신중 투여에 대한 안전성이 확립되지 않았으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다. 신생아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유중인 여성에게는 투여하지 않는다.
- 7. 고령자에 대한 투여** - 주로 신장으로 배설되나 고령자는 신기능이 저하되어 있는 경우가 많아 높은 혈장농도가 지속될 우려가 있으므로 이량반응(추체외도 증상 등)의 발현에 주의하고 용량 및 투여간격에 유의하는 등 신중히 투여한다.
- 8. 기타**
- 1) 진토작용으로 다른 약에 기인하는 중독, 정맥색, 뇌종양에 의한 구토증상이 나타나지 않게 할 수 있으므로 충분히 관찰하고 신중히 투여한다.
 - 2) 동물 만성독성 실험에서 정소위축과 번식실험에서 임신율의 저하를 일으킨다는 보고가 있다.
 - 3) 베타 및 마우세에 고용량을 투여한 결과 하수체, 유선 등의 종양발생 빈도가 대조군에 비해 높다는 보고가 있다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【제조사】 윤니메드제약(주) - 충남 아산시 신흥로 110-27

첨부문서 작성년월일 : 2014. 12. 15

※ 이 약의품은 엄격한 품질관리를 할 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병의원 등의 고객센터에 하여 교환하여 드립니다.

본 포털정보는 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유네스코지명 홈페이지 또는 고강상달실을 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객상담실 : 080-500-5100

제주소

UNIMED 유니메드제약

(본사)서울특별시 송파구 잠전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩