

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

위통, 속쓰림, 체함, 구역에

씨메탈시[®] 정

CIMETALCI Tab.

일반의약품
 분류번호: 제산제(02340)



【원료약품의 분량】 1정 중
 시메티딘(KP) 50.0mg
 규산알루미늄산마그네슘(NF) 100.0mg
 히드로탈시트(BP) 125.0mg
 탄산수소나트륨(KP) 100.0mg

【성상】 백색의 타원형 필름코팅정제

【효능·효과】 위통, 속쓰림, 체함, 구역

【용법·용량】 성인(15세 이상 ~ 80세 미만) : 1회 2정씩 복용한다. 필요시 4시간 간격으로 1회 2정씩 1일 3회까지 복용할 수 있다. 단, 1일 3회(6정)를 초과하여 복용하지 말 것.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 다음 질환으로 치료를 받고 있는 환자 : 혈액질환, 신장(콩팥)·간장질환, 위·십이지장질환, 천식·류마티스 등의 만성질환(때때로 백혈구감소나 혈소판 감소 등이 나타날 수 있다)
 - 다음 약물을 투여 받고 있는 환자 : 스테로이드제, 항생물질, 항암제, 아졸계 항진균(곰팡이)제(때때로 백혈구감소나 혈소판감소 등이 나타날 수 있다)
 - 적혈구감소증, 혈소판감소증, 백혈구감소증 등의 혈액이상 병력이 있는 환자 (혈구수의 감소가 증가될 수 있다)
 - 히스타민 H₂-수용체 길항제(억제제)에 과민증의 병력이 있는 사람
 - 소아(15세 미만) 및 고령자(노인)(80세 이상) : 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며(사용경험이 적다), 80세 이상의 고령자(노인)에서는 신기능의 저하로 인해 혈중농도가 높아져 약효가 강하게 발현(드러냄)될 수 있다.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 시메티딘은 모유중 이행되므로 수유부가 복용할 경우에는 수유하지 않도록 주의한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 다른 위장약(작용이 강하게 발현되어 예기치 못한 이상반응이 나타날 수 있다)
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 이 약의 복용에 의해 드물게 졸음, 어지럼, 혼란감이 생길 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 말 것.
 - 이 약을 복용할 시에는 알콜음료를 섭취하지 말 것(혈중 알콜농도를 높일 수 있다).
 - 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 이 약의 진료를 받고 있는 환자 또는 다른 약물을 복용중인 사람 : 약물 상호작용에 의해 이상반응의 발현 및 효과의 감소가 나타날 수 있다.
 - 이 약에 함유된 시메티딘은 다음 약물들과 상호작용으로 이들의 배설을 지연시켜 약효가 강하게 나타날 수 있다. : 기관지확장제(테오필린 등), 혈액응고저지제(와르파린 등), 항전간제(페니토인 등), 벤조디아제핀계 약제(디아제팜, 트리아졸람 등), 삼환계항우울제(이미프라민 등), 협심증·고혈압 치료제(베다-차단제 프로프라놀롤 등), 칼슘길항제(니페디핀 등), 부정맥치료제(메실레틴 등), 마크로라이드계 항생물질(에르트라사이클린 등), 뉴-퀴놀론계 항균제(오픈록사신 등)
 - 이 약에 함유된 제산제는 다음 약물들과 상호작용으로 흡수가 저해될 수 있다. : 테트라사이클린계 항생물질 및 뉴-퀴놀론계 항균제
 - 약물에 의한 과민반응의 병력이 있는 사람
 - 고령자(65세 이상) : 80세 미만의 고령자에 대해서도 생리기능 저하에 의한 개인차가 있으므로 신중히 복용한다.
 - 인후통, 기침 및 고열이 있는 환자 : 심각한 감염증의 우려가 있으며, 혈구감소 등의 혈액 이상이 인정될 수 있다. 이러한 증상은 이 약의 복용에 의해 증상이 악화되거나 이 약의 이상반응을 은폐시킬 수 있다.
 - 원인불명의 체중감소가 있는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.

- 복통이 지속되는 환자 : 원인이 되는 다른 질환이 있을 수 있다.
- 신장병의 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 복용 직후에 두드러기, 부종, 가슴답답함과 동시에 안색蒼蒼, 수족냉증, 식은땀, 숨가쁨 등 이 나타나는 경우
 - 고열을 동반한 발진, 발적, 열상의 수종 등의 심한 증상이 전신의 피부, 입, 눈의 점막에 나타나는 경우
 - 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움, 부종)이 나타나는 경우
 - 변비, 설사, 두통, 발열, 권태감, 탈력감, 감기 증상, 하지·점막하출혈, 사지저림 및 굳은감, 두근거림, 황달, 전신부종, 혈뇨가 나타나는 경우
 - 3일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 : 다른 질환이 있을 수 있다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 장기적으로 계속 복용 하지 말 것.
 - 2주간을 초과하여 계속 복용하지 말 것.
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 과량 복용시에는 즉시 복용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 첨부문서 작성일자후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800에서 확인 할 수 있음.
 ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품용어 설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr)의약품 정보 참조"

문서작성년월일 : 1998. 08. 18
 문서개정년월일 : 2016. 02. 24

제조 발매원
조당약품공업(주)
 경기도 안산시 단원구 별망로 381