



피부질환치료제

나 이 드 크림

플루오시노이드 (Fluocinonide)

전문의약품
분류번호: 264

본제 나이드 크림은 항염, 항알러지 및 여러가지 피부염에 사용하는 외용부신피질 호르몬제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

플루오시노이드(USP).....	0.5mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	1.6mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP).....	0.4mg

【성 성】 유백색의 크림제.

【효능·효과】

알레르기피부염, 접촉피부염, 만성단순태선(신경피부염), 아토피피부염, 원판상홍반성루푸스, 지루피부염, 건선, 벌레물린대, 원형탈모증, 방사선피부염, 양진(가려움발진)

【용법·용량】

1일 3~4회 적당량을 환부에 잘 문질러 바른다. 증상이 개선되면 1~2회로 투여횟수를 줄인다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 피부결핵, 단순포진, 수두, 대상포진, 종두진, 매독 환자
- 2) 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- 3) 고막에 천공이 있는 습진성 외이도염 환자(천공부위의 치료가 지연되고, 감염이 유발될 수 있다.)
- 4) 피부귀염(베체트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상 및 동상 환자(피부재색이 억제되고 치유가 지연될 수 있다.)
- 5) 세균, 진균 스피로헤타, 바이러스 피부감염 또는 동물성 피부병(곰, 사면발이 등) 환자 (감염증을 악화시킬 수 있다.)
- 6) 주사(rosacea), 여드름, 입주위피부염 환자
- 7) 항문주위 및 생식기 가려움 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 피부감염증 : 때때로 피부의 진균성(칸디다증, 백선증 등) 및 세균성 (전염성 농가진, 모낭염 등), 바이러스 성 감염증이 나타날 수 있다. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항진균제나 항균제 등을 병용하고 증상이 빨리 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지 한다.
- 2) 기타의 피부증상 : 때때로 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관 확장), 스테로이드 성 주사·입주위 피부염(입주위, 안면 전체에 홍반, 구진, 모세혈관 확장, 가피, 인설 등이 생긴다), 드물게 어란선(魚鱗瘻)양 피부변화, 자반, 다모, 색소탈락, 피부건조 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용을 중지하고 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
- 3) 과민증 : 피부 자극감, 가려움, 홍반, 발진, 종창 등이 나타날 수 있다.
- 4) 뇌하수체·부신피질계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용에 의해 뇌하수체·부신피질기능 억제가 나타날 수 있다.
- 5) 눈 : 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용에 의해 후낭하백내장, 녹내장이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 1) 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이한 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신작용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려 한다.
- 2) 대량, 장기간, 광범위하게 사용함으로써 코르티코이드 전신투여와 같은 증상이 나타날 수 있으므로 정기적으로 의사의 검진을 받는 것이 필요하다.
- 3) 장기간의 연속적인 사용은 특히, 영·유아 및 소아에 있어 밀봉봉대법을 사용하지 않을 경우에도 부신 억제 를 초래할 수 있으므로 피한다.
- 4) 안면에 사용할 경우 기간은 가능한 5일 이내로 제한하고, 밀봉봉대법은 사용하지 않는다.

5) 장기연용하지 않는다.

6) 건선에 국소 코르티코이드 약물을 사용하는 것은 반동성 재발, 내성 발현, 전신성 농포성 건선의 위험 및 피부 장벽 기능의 장애로 인한 국소 또는 전신적인 독성 등으로 위험하므로 신중히 투여한다.

7) 증상이 개선되지 않거나 증상이 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.

8) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 사용을 피한다.

2) 피부에 장기간, 광범위하게 사용시에는 수유를 하지 않는 것이 바람직하다.

6. 소아에 대한 투여

유·소아에게 이 약의 장기간에 걸쳐 대량 사용 또는 밀봉봉대법에 의하여 발육장애를 가져올 수 있다(기저귀도 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있다).

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에 투여시 부작용이 나타날 수 있으므로 대량 또는 장기간 광범위한 부위에 밀봉봉대법을 사용하는 경우 특히 주의한다.

8. 적응상의 주의

1) 안과용으로는 사용하지 않는다.

2) 화상이나 면도 후 등 치료이외의 목적으로 사용하지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 건냉암소(15°C 이하)보관

【포장단위】 20g, 30g / 튜브, 500g / 병

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.

※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 사용(유효)기한이 유효하지만 기재되어 있는 경우에는 해당 월의 마지막일까지 사용가능합니다.

※ 소비자상담전화 : 080-300-8282

첨부문서 개정년월일 : 2017. 04. 06

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
충청남도 부여군 초촌면 금백로 821

M110013-01