

카르민 주 0.8%

CARMINE Inj. 0.8%

(Indigocarmine)

정맥주사용



【원료약품 및 그 분량】 1앰플(5mL) 중
인디고카르민(KP)

40mg

【성 상】

어두운 청색의 액이 든 갈색 앰플

【효능 · 효과】

신기능 검사

【용법 · 용량】

20~40mg을 정맥주사한 후 방광경으로 처음 배설시간을 측정한다.

【참고】

정상인의 처음 배설시간은 3~5분이고 늦어도 10분 이내면 기능이상은 아니다.

신장해가 있는 경우에는 처음 배설시간이 지연된다.

이 밖에 색소가 뇨중 배설 최고농도에 도달하는 시간(정상 5~7분), 배설지속시간(정상 90분)을 측정하는 경우도 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히, 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
본제에 대해서 과민증의 기왕력이 있는 환자
3. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 알레르기 증상이 있는 환자
 - 2) 고령자
 - 3) 고혈압의 환자
4. 일반적 주의
주입에서 검사 종료까지 환자를 옆으로 눕히거나 앉히는 등 안정하게 관찰을 충분히 한다.
5. 이상반응
 - 1) 속 : 드물게 속이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 한다.
이와 같은 증상이 나타났을 경우에는 중지하고 적절한 조치를 취한다.
 - 2) 과민증 : 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있다.
 - 3) 소화기 : 혈압 상승, 서맥 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 4) 소변기 : 오심, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.
6. 임신부 · 수유부예의 투여
임신 중이거나 수유 중의 투여에 있어서는 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임신부 또는 임신 가능성이 있는 부인이나 수유중의 부인에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

【저장방법】

차광한 밀봉용기, 실온(1~30℃)보관.

【포장단위】

5mL x 자사 포장 단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다.

* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.

* 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의약정보부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

IS1016-80808

최종개정일자: 2008년 7월 18일



한국유나이티드제약 (주)

충남 연기군 서면 부동리 153

