

엑코스정

【원료약품 및 분량】 1정(200mg)중

트리프롤리딘염산염(USP).....	2.5mg
수도에페드린염산염(USP).....	60mg

첨가제 : 유당수화물(소, 우유)

【성상】 가운데 분할선이 있는 흰색의 원형정제

【효능·효과】

코감기, 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물

【용법·용량】

성인 : 1회 1정
 소아(8~14세) : 1회 1/2정
 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증의 간 및 신기능 장애 환자
 - 중증의 관상 심장 질환 환자
 - 진뇨 형성을 수반하는 배뇨장애 환자
 - 고혈압 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 2세 이하의 영아
 - MAO 저해제를 투여중인 환자
 - 파라옥시안식향산에질에 과민증 환자(파라옥시안식향산메칠 함유 제제에 한함)
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 천식 환자 2) 녹내장 환자 3) 고혈압 및 관상동맥질환 환자
 - 심질환 및 부정맥 환자 5) 당뇨병, 감상선기능항진증 환자
 - 전립선비대로 인한 배뇨곤란 환자 7) 7세 이하의 소아
- 부작용
 - 중추신경계 : 진정, 졸음, 중추 신경 쇠약, 중추 흥분, 불안, 발한, 경미한 혈압강하, 시력장애, 산동, 헛소리, 환각, 흥분, 근육경련, 경직, 아테토시스, 간대성 및 강직성 경련, 고열, 호흡마비, 혼수, 순환기 마비가 나타날 수 있다.
 - 과민증 : 피부반응, 일시적인 자국통, 작열감이 나타날 수 있다.
 - 소화기계 : 구갈, 구역, 구토가 나타날 수 있다.
 - 비뇨기계 : 배뇨곤란이 나타날 수 있다.
 - 소아에서 특히 흥분이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 이 약의 투여중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 중사하지 않도록 주의한다.
 - 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 연용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 7세 이하의 소아에게는 필요한 경우 시럽제를 복용하되 용법·용량을 잘 지키고 표시된 연령 이외의 소아에게는 투여하지 않는다.
- 상호작용

혈압강화제, 알코올, 중추신경억제제(수면제, 진정제, 안정제), MAO저해제, 교감신경흥분제, 삼환계 항우울제, 구아네티딘, 브레틸리움 베타나이드, 데브리소퀸, 메칠도파, 교감신경성약(중추혈제, 거제, 식욕 억제제, 암페타민류의 신경자극제), α 및 β 아드레날린 저해제와 병용투여하지 않는다. MAO저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제 투여 최소 15일후 이 약을 투여한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 안전성이 확립되지 않았으므로 투여하지 않는다.
 - 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는다.
- 소아에 대한 투여

소아에서 특히 부작용이 크게 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 과량투여시의 처리

과량투여 시 급성 중독(환각 및 경련), 신경과민, 어지러움, 불면증 등을 일으킬 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 위세척, 방광 카테터 삽입법을 사용한다. 수도에페드린 제거에는 투석하도록 한다.
- 자장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오용을 막고 품질의 보전을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온보관

【사용(유효)기간】 3년

【포장단위 100정】

- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 사항은 이지드렉(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)—정보마당—의약품 정보란 참조하여 주세요.
- ※ 만약 구입 시 사용(유효)기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.



KGMP
적격업체

(주)한국코러스제약

충북 제천시 강제동 253-12
www.koruspharm.co.kr