



복합탈시드®

추어블정

일반의약품 / 제산제

※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

현대인의 스트레스, 불규칙한 식사습관, 음주, 흡연, 각종 기호품 등의 무분별한 복용은 위산의 과잉분비를 가져와 위점막의 손상 및 염증을 유발하여 속쓰림, 위통, 신트림 등의 증상을 나타냅니다.

복합탈시드® 추어블정은 이러한 증상을 신속하고 지속적으로 개선하여 위장의 보호뿐 아니라 치료의 가능성을 높여준 새로운 위장약입니다.

복합탈시드 추어블정은 손상된 위점막의 수복, 재생을 촉진하여 위산에 대한 방어력을 증가시키는 동시에 과잉분비되는 위산의 양에 따라 필요한 양만큼 위산에 중화되는 산중화 기능을 지니고 있으며 1회 1정 복용의 씹어먹는 정제타입으로서 휴대하기 간편한 위장약입니다.

특징 및 개요 :

1. 재산효과
복합탈시드® 추어블 정 성분 중 히드로탈시드는 위장내 산도(pH) 즉 과잉 분비되는 위산의 양의 정도에 따라 산중화작용이 조절되므로 필요이상의 과다반응을 일으키지 않고 적정중화 수준인 pH 3.5~5.0을 알맞게 유지시켜 줍니다.

2. 위통증 개선효과

복합탈시드® 추어블정 성분중 수용성 아줄렌은 식물성 성분으로서 위벽내 염증성 점막에 직접 작용하고 펩신(Pepsin)의 분비를 억제하여 위점막 손상으로 인한 통증 개선에 효과를 발휘합니다.

3. 조직 수복효과

엘-글루타민 (L-Glutamine)은 위점막 상피구성 성분인 헥소사민(hexosamine)과 글루코사민(glucosamine)의 생합성에 관여, 조직의 수복을 촉진하여 손상된 위점막의 재생에 상승효과를 증강시킵니다.

원료약품 및 그 분량 : 1정(1,125밀리그램)중 히드로탈시드(B.P) 259밀리그램, L-글루타민(USP) 140밀리그램, 수용성 아줄렌(KPC) 2밀리그램을 함유합니다.

성 상 : 담청색의 원형 추어블정 입니다.
(푸른점상은 수용성 아줄렌의 성분으로 인한 색상입니다.)

효능 · 효과 : 속쓰림, 위부불쾌감, 위통, 위산과다, 구역, 구토, 위부팽만감, 위체, 신트림

용법 · 용량 : 성인(15세이상) 1회 1정, 1일 3회 식전 또는 식간의 공복시에 씹어서 복용하거나 입안에서 녹여서 복용합니다.

사 용 상 의 : 주 의 사 항

- 경고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 “아스파탐”은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
투석요법을 받고 있는 환자(장기투여에 의해 알루미늄노증, 알루미늄골증 등이 나타날 수 있습니다.)
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 신장장애 환자(장기투여에 의해 알루미늄노증, 알루미늄골증 등이 나타날 위험이 있으므로 정기적으로 혈중 알루미늄, 인, 칼슘, 알칼리포스파타제 등을 측정하십시오.)
 - 인산염 결핍환자

- 3) 심기능 장애환자
- 4) 설사 환자
- 5) 고마그네슘혈증 환자
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 다른 약물을 투여 받고 있는 사람

4. 부작용

- 1) 대사이상
장기 대량(많은양) 투여에 의해 고마그네슘혈증, 인산염 저하가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 감량(복용량을 줄임) 또는 휴약(복용중지) 등 적절히 조치하십시오.
- 2) 소화기계
때때로 식욕부진(입맛없음), 구역, 구토, 연변(붉은변), 변비, 설사, 복통(배아픔), 팽만감, 드물게 구갈(목마름), 위부불쾌감(배가 거북함) 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 기타
때때로 안면(얼굴)홍조가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적인 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에 복용시키지 마십시오.
- 3) 이 약은 반드시 씹어먹거나 또는 입안에서 녹여서 복용하십시오.
- 4) 본제(이 약)의 복용으로 알려지 증상(예:발진, 가려움 등)이 일어날 경우 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담하십시오.
- 5) 2주간 복용해도 증상의 개선(나아짐)이 없을 경우 일시 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담하십시오.

6. 상호작용

- 1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용(함께 복용)하지 마십시오.
- 2) 이 약의 흡착작용, 또는 소화관내, 체액의 pH상승에 의해 병용(함께 복용) 약제의 흡수, 배설에 영향을 주 수 있으므로 신중히 투여합니다.
- 3) 대량(많은양)의 우유, 칼슘제제와의 병용에 의해 Milk Alkali Syndrome (고칼슘혈증, 고질소혈증, 알칼로시스(알칼리증: 몸 속의 체액이 알칼리화 되려는 경향) 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지합니다.

7. 저장시 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 가능한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.
- 4) 개봉 후 품질보존상 6개월 이내에 사용하십시오. 또한 사용기한(케이스에 표기)이 지난 약은 복용하지 마십시오.

포 장 단 위 : 10정

저 장 방 법 : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과 되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자나 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 개정년월일 이후 변경된 내용은 <http://cc.bayerhealthcare.co.kr> 이나 (02) 829-6600 에서 확인할 수 있습니다.

본 제품은 재정부 고시에 의거 소비자의 정당한 피해를 보상해 드립니다.

제 조 의 리 자 : **바이엘코리아(주)**

경기도 안성시 미양면 계곡리 268-3

첨부문서

개정년월일: 2008.12.24

제 조 자 : **(주)한독약품**

충청북도 음성군 대소면 대동리 37번지 전화)02-527-5114

583954