

효과 빠르고 안전한 종합감기약

감바로

과립

KGMP 적격지정제 / 일반의약품 / 분류번호 : 114

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

감기는 여러 질병의 원인이 되기 때문에 걸렸다 싶으면 바로 고쳐야 합니다. 감바로과립은 한방 감기 약인 「갈근탕」에 양방 해열·진통·소염제를 합방한 복합 감기 몸살약입니다.

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

갈근(葛根)Puerariae Radix(KP)	746.7mg
마황(麻黃)Ephedrae Herba(KP)	373.3mg
(총알칼로이드(에페드린 및 슈도에페드린)으로서 2.61mg)	
대추(大棗)Zizyphi Fructus(KP)	373.3mg
육계(肉桂)Cinnamomi Cortex(KP)	280.0mg
(신남산으로서 0.084mg)	
작약(芍藥)Paeoniae Radix(KP)	280.0mg
(패오니플로린으로서 5.6mg)	
감초(甘草)Glycyrrhizae Radix(KP)	186.7mg
(글리시리진산으로서 4.67mg)	
건강(乾薑)Zingiberis Rhizoma(KP)	93.3mg
이상 수침연조엑스 816.7mg	
에텐자미드Ethenzamide(KP)	360.0mg
클로르페니라민말레산염Chlorpheniramine Maleate(KP)	2.5mg
노스카핀Noscaphine(KP)	16.0mg
카페인무수물Caffeine Anhydrous(KP)	50.0mg
동물유래성분(유당수화물/소/우유)	

주성분의 작용

주 성 분	작 용
갈근탕엑스	감기 몸살로 오한, 발열, 두통, 어깨가 결리거나 뻣근함을 가라 없힙니다.
에텐자미드	열을 내리게하고 두통과 뼈마디가 쑤시고 아픈 통증을 가라 없힙니다.
노스카핀	기침을 가라 앉히고 가래를 없애지게 합니다.
클로르페니라민 말레산염	감기 등 상기도염(上氣道炎)에 수반되는 재채기·콧물·코막힘·기침 등에 효과가 있습니다.
카페인무수물	두통, 해열 진통약의 효과를 높입니다.

성상 : 갈색의 과립제

효능·효과 : 감기 증상(여러 증상) (콧물, 코막힘, 재채기, 인후(인후)통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

용법·용량 : 15세 이상의 성인 1회 1포 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

어린이 1회 : 11세 이상 ~ 15세 미만 2/3포
7세 이상 ~ 11세 미만 1/2포
3세 이상 ~ 7세 미만 1/3포
2세 이상 ~ 3세 미만 1/4포

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

사용상의 주의사항

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용(사용)해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용(사용)하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
- 다음 사람은 복용(사용)하지 말 것
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

- 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기)·유아 및 14세 이하의 어린이
4) 간장, 신장(콩팥), 감작성질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자(노인)
6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 누)곤란이 있는 사람
7) 수유부
8) 부종(부기)이 있는 환자
9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자
- 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
- 복용(사용)할 때 다음 사항을 주의할 것
1) 용법·용량을 잘 지킨다.
- 다음 약들과는 동시에 복용(사용)하지 않는다.
진해(기침을 그치게 함)거담약(가래약), 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 소아에게 복용(사용)시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용(사용)시킨다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
1) 이 약의 복용(사용)에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈가물이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담한다.
2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용(사용)량이 감소로서 1g이상인 제제는 장기 연용(계속 사용(복용))할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용(사용)을 중지한다.
3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용(사용)을 중지한다.
- 복용(사용) 중 또는 복용(사용) 후에는 다음 사항을 주의할 것
1) 복용(사용)하는 동안 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 누)곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용(사용)을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
2) 칼륨함유제제, 갑조함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 차이지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
3) 복용(사용)하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피한다.
4) 수화(여러 차례) 복용(사용)하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
5) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
3) 의약품용 원래 용기에서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관한다.

저장방법 및 사용기간 : 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 5포, 240포

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기나 또는 온라인의약도서관(http://drug.mfds.go.kr)서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2015. 10. 22

제조사

한솔신약(주)

충북 음성군 청령포 청령당
Hansol Pharm. Co., Ltd. 2~11도량리 33-302

HS : 101111