

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 기관지염 · 기관지천식 ▶ 묽은담을 수반하는 기침 ▶ 콧물 · 비염

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

마 황(KP)	1.00g
작 약(KP)	1.00g
전 강(KP)	1.00g
감 초(KP)	1.00g
계 지(생규)	1.00g

세 신(KP)	1.00g
오미자(KP)	1.00g
반 해(KP)	2.00g
이상수침연조엑스 2.24g	
동물유래성분(유당수화물 / 소 / 우유)	

성 상 : 갈색의 과립

효능 · 효과 : 기관지염, 기관지천식, 콧물, 묽은 가래를 수반하는 기침, 비염(코염)

용법 · 용량 : 보통 성인 1회 3회, 1회 1포(3.0g)를 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.) 2) 고혈압 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리 기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.) 4) 심장에 한해 질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 5) 신장(콩팥)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 6) 부종(부기) 환자 7) 지금까지 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 8) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 9) 입부 또는 입신하고 있을 가능성이 있는 여성 10) 현저하게 위장이 약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.) 11) 땀이 많이 나는 환자(과다, 전신무력감 등이 나타날 수 있다.) 12) 감작성기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 13) 배뇨(소변)을 농장(농)에 한해 질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 14) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 15) 당뇨병 환자(마취(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승 할 수 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 1) 위알도스테론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 팽만), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) 2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소회기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등 (5) 간장애 : 전신 권태감, 황달(피부 또는 눈의 흰자위에 황색으로 됨) 등 (6) 간질성 폐렴 : 기침을 수반한 숨찬, 호흡곤란, 발열 등 (7) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 농)장애 (8) 자율신경계 : 불안, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신충분감, 2) 1개월(첫물, 묽은 가래를 수반하는 기침에 복용할 때에는 5 ~ 6일) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용시킬 것(어린이에 대한 용법 · 용량이 있는 제품에 한함) 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이디드와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중독에 주의할 것. 5) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 6) 마취 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감작성제제(티록신, 리오오진), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 코산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용(함께 복용) 시 불면, 떨 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신충분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
- 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 60포

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2015. 01. 20