

옥미인단

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 253

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 생리기능장애 ▶ 적·백대하 ▶ 월경시 통증 ▶ 손발 차가움 ▶ 빈혈 ▶ 어지러움 ▶ 건망증

원료약품의 분량 : 1환(70mg) 중

항부자(KP).....	11.0mg
작 약(KP).....	5.6mg
(때오니플로린으로서 0.11mg)	
현호색(KP).....	2.2mg
시리자(생규).....	1.1mg
감 초(KP).....	2.2mg
(클리시리진산으로서 55μg)	
속지황(KP).....	5.6mg
백 출(KP).....	4.4mg
육 계(KP).....	2.2mg
(신남산으로서 0.66μg)	

목단피(KP).....	2.2mg
(때오니플로린으로서 0.01mg)	
천 궁(KP).....	5.6mg
사 인(KP).....	3.3mg
아 교(생규).....	1.1mg
견 강(KP).....	2.2mg
당 귀(KP).....	5.6mg
오수유(KP).....	2.2mg
진 피(KP).....	5.6mg
복 령(KP).....	5.6mg

성 상 : 흑갈색 환제

효능·효과 : 월경불순, 자궁허냉, 대하, 적탁(赤濁), 소변이 혼탁(흐림)한 적색을 띠는 증상), 백탁(白濁, 소변이 혼탁(흐림)한 백색을 띠는 증상), 월경시 요(허리)통, 복통(배아픔), 두통, 어지러움, 손·발의 차가움, 소화불량, 혈액부족, 쇠약, 건망, 정충(怔忡, 심계항진(두근거림)), 빈뇨, 구역, 구토, 히스테리, 냉적, 혈적, 생리가능 장애

용법·용량 : 보통 성인 1회 50~60환을 1일 2회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 물 또는 따뜻한 물로 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 목단피에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장에 또는 신장(콩팥)장애 환자 3) 부종(부기)환자 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 현재저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다) 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위일도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼혈철증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관혈혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것) (2) 근병증(근육병증) : 저칼혈철증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 클리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이드)와 병용(함께 복용)시 위일도스테론증이나 저칼혈철증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 3) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성분의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품의 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

지장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 60포, 120포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333 또는 온라인 의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>)을 참조하세요.

첨부문서 개정 년월일 2014. 10. 17

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd. 총괄 영업장: 서울특별시 영등포구 대림3동 33-32

HS : 010610