

안전한 천식 · 해소 · 기침치료제

청상기가환

(청상보화환)

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 222

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 가래가 끓어오르는 기침 · 가래 ▶ 숨이 차고 호흡이 곤란한 기침 ▶ 심하고 오래가는 기침 · 가래

원료약품의 분량 : 1포(2.4g) 중

숙지황(KP).....	187.5mg
산 약(KP).....	93.5mg
산수유(KP).....	93.5mg
목단피(KP).....	70.0mg
복령(KP).....	70.0mg
택사(KP).....	70.0mg
지실(KP).....	70.0mg
황련(KP).....	70.0mg
황금(KP).....	70.0mg

오미자(KP).....	70.0mg
맥문동(KP).....	70.0mg
천문동(KP).....	70.0mg
패모(KP).....	70.0mg
길경(KP).....	70.0mg
행인(KP).....	70.0mg
반하(KP).....	70.0mg
과루인(KP).....	70.0mg
감초(KP).....	23.25mg
동물류래성분(유당수화물 / 소 / 우유)	

형상 : 흑갈색의 환제

효능 · 효과 : 기침, 천식

용법 · 용량 : 보통 성인 1회 1포(2.4g)를 1일 3회 식후에 따뜻한 물과 함께 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 신생아 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 수유부 4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)부해호소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리능력이 저하되어 있으므로 감람(알)을 등 주의할 것.) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용(사용)에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용(사용)량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용(사용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 팽임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용(사용)을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용(사용)을 중지할 것. 2) 1개월 정도 복용(사용)하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용(사용)하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용(사용)할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 3) 칼륨함유제제, 갑상선호르몬제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 푸르제 이노제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용(사용)할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용(사용)할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 건조소(15℃이하)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 45포, 90포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2014. 02. 10

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd. 총독 유선근 관원을 대행함 2-히도정리 33-32

HS : 151010