

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶코막힘 ▶만성비염 ▶축농증 ▶비충혈

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

갈근(KP).....	1.33g
마황(KP).....	1.00g
대추(KP).....	1.00g
작약(KP).....	0.67g
건강(KP).....	0.33g

감초(KP).....	0.67g
계지(생규).....	0.67g
천궁(KP).....	1.00g
신아(생규).....	1.00g
이상수침연조엑스 2.5g	
동물유래성분(유당수화물/소/우유)	

성 상 : 갈색의 과립

효능 · 효과 : 코막힘, 부비동염, 만성비염(코염)

용법 · 용량 : 보통 성인 1회 1포(3.0g)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 평소 편이 많이 나는 환자 2) 체력이 쇠약한 환자 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것 1) 고혈압 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 2) 심장에 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 3) 신장(콩팥)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 4) 부종(부기) 환자 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.) 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 7) 현재까지 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.) 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 9) 중증(심한 증상) 신장(콩팥)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 10) 배뇨(소변을) 농(농)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 11) 갑상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 12) 당뇨병 환자(마황(에페드린) 류에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.) 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 14) 지금까지 약에 의한 발진 · 발적(출혈)되어 붉어짐, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 5) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타날 경우 (1) 위압(위압)증상 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(일 최대 복용량에 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저혈압, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위압(위압)증상이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청나트륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저혈압(혈압)의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 피부 : 발진 · 발적(출혈)되어 붉어짐, 가려움 등 (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등 (5) 자율신경계 : 불면, 꿈 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신충분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량(줄임)하는 등 신중히 복용할 것.
- 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.), 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못) 사용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 60포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→(정보마당)→(의약품등 정보)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

한솔신약(주)

충북 음성군 관동읍 청평리
Hansol Pharm. Co., Ltd. 2-15호(동) 33-30

첨부문서 개정 년월일 2013. 05. 21

HS : 080710