



진경(경련완화)제

일반의약품

분류번호: 124

이지정

(디싸이클로민염산염)

위·장·방광·자궁·노관 등 평활근으로 구성되어 있는 장기가 비정상적으로 수축하면 경련과 함께 통증이 유발하게 됩니다. 이지정은 항신경성 진경(경련완화)작용(항콜린 작용)과 항근성 진경(경련완화)작용(직접적인 평활근 이완작용)의 이중 작용으로 이러한 경련과 이에 수반되는 복통(배아픔), 위통, 산통 등의 통증을 억제하는 효과 빠른 진경(경련완화)제로서 위장경련, 자궁 및 방광경련, 담관(쓸개관)경련 등에 신속한 진경(경련완화)작용이 있으며 또한 위산분비 억제 작용이 있어 위·십이지장 궤양의 경우 제산제와 병용(함께 복용)하면 제산효과를 증대시키고 통증을 신속히 없애줍니다.

【성분·함량】 (1정 중)

디싸이클로민염산염(Dicyclomine HCl) (KP) 10mg

첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호

【성상】 하늘색의 장방형 필름코팅 정제

【효능·효과】

다음 질환에 있어서의 경련 : 위·십이지장궤양, 위염, 대장염, 담낭(쓸개)염, 게실(결주머니)염, 유문연축(수축과 이완), 식도경련, 경련성 변비, 요로결석

【용법·용량】

• 성인 : 디싸이클로민염산염으로서 1회 10~20mg 1일 3~4회 경구투여(복용) 하십시오.

※ 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) 녹내장 환자 | 2) 전립선(전립샘)비대에 의한 배뇨(소변을 누)장애 환자 |
| 3) 중증(심한 증상)의 심질환 환자 | 4) 폐쇄성 요로질환 환자 |
| 5) 유문협착 등 위장관폐색 환자 | 6) 마비성 장폐색(장자막힘) 환자 |
| 7) 장의 무긴장증 환자 | 8) 급성 출혈기의 불안정한 심혈관 상태 환자 |
| 9) 이 약에 과민증 환자 | 10) 6개월 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기) |
| 11) 수유부 | 12) 중증(심한증상) 근무력증(근육무력증) 환자 |
| 13) 중증(심한증상)의 궤양성 대장염 환자 | 14) 거대결장 환자 |
| 15) 역류성 식도염 환자 | |
| 16) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다. | |

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) 자율신경병증 환자 | 2) 간·신(콩팥)질환 환자 |
| 3) 고혈압 환자 | 4) 갑상선기능 항진증 환자 |
| 5) 전립선(전립샘) 비대 환자 | 6) 심기능장애(울혈성 심부전, 부정맥 등) 환자 |
| 7) 고온 환경에 있는 환자 | 8) 궤양성 대장염 환자 |
| 9) 고령자(노인) | |

3. 부작용

- 1) 눈 : 때때로 시(시각)조절장애, 안내압(눈 내부 압력)항진 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 두통, 두중(머리 무거움), 어지러움, 졸음 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 소화기계 : 구갈(목마름), 변비, 때때로 설사, 묽은변, 구역·구토, 복부팽만·불쾌감, 고장 (복부팽만), 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 순환기계 : 때때로 심계항진(두근거림) 등이 나타날 수 있습니다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진·가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 6) 비뇨기계 : 때때로 배뇨(소변을 누)장애가 나타날 수 있습니다.
- 7) 기타 : 때때로 권태감, 무력감이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

시(시각)조절장애, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.

5. 상호작용

페노티아진계 약물, 삼환계 항우울약, MAO 저해제(억제제)와 병용(함께복용)시 이 약의 항콜린 작용이 증강될 수 있으므로 주의하십시오.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 및 수유부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.

8. 고령자(노인)에 대한 투여

고령자(노인)에는 이 약의 항콜린 작용으로 인한 구갈(목마름), 배뇨(소변을 누)장애, 변비, 안내압(눈 내부 압력)항진 등의 부작용이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준" 에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**
충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2015.03.04