

● **성상** : 알칼시의 분말이 든 상 · 하 담색의 불투명한 캡슐
 ● **효과** : 감기의 재증상(코막힘, 코막힘, 재채기, 목의 통통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화
 ● **용법** : 용량 : 성인(15세 이상) 1회 2캡슐, 7세이상 15세 미만 1회 1캡슐, 1일 3회, 식후 30분 이내에 복용하십시오
 ● **사용상의 주의사항** : 다음 환자에는 투여하지 말 것 (경구제 및 주사제에 한함)
 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

1. 다음 환자는 복용하지 마십시오.

1) 지금까지 이 약으로 인한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종, 두통, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약이나 해열진통제를 사용해서 전신을 일으킨 적이 있는 사람

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 열악이 높은 환자 또는 고령자 2) 부종이 있는 환자 3) 본인 또는 양친, 형제 등이 발진, 피부병, 기관지천식, 알러지성비염, 편두통, 음식물알러지 등을 일으키기 쉬운 체질인 사람 4) 지금까지 약으로 인한 알러지 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 지혈이 있는 사람, 물이 허약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 간장, 심장 또는 신장에 장애가 있는 사람 7) 녹내장(예를 들면 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 당뇨나 곤란한 사람 8) 인테르페론제제로 치료를 받고 있는 사람 9) 임신부 또는 임신했을 것으로 생각되는 사람 10) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

3. 복용시 다음 사항을 주의하십시오.

1) 이 약은 극악에 해당하는 성분도 포함되어 있으므로 정해진 용법, 용량을 엄수하십시오 2) 다른 약제와는 동시에 복용하지 마십시오. 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해제, 항히스타민제 등 3) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시키십시오 4) 이 약은 7세 미만의 유아에게는 복용시키지 마십시오

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본체의 복용에 의해 노약이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 열악이 오거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것 2) 위약도스테론증 : 1일 최대 복용량이 갑작스럽게 1g 이상인 제제는 정기면역할 경우 자갈혈혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위약도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의

증상)를 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것. 3) 근병증 : 자갈혈혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경직, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. 4) 이 약의 복용으로 인하여, 드물게 다음 증상이 나타나는 것이 보고되었습니다. 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담하십시오. (1) 이 약의 복용 후 즉시 발진, 부종, 두통, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴의 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 손발이 차가워지며, 식은땀, 숨막힘 등이 나타날 경우, (2) 고열을 동반한 발진, 발적, 화상모양의 물집 등의 격심한 증상이 전신의 피부와 입, 눈의 점막에 나타날 경우, (3) 천식이 나타날 경우, (4) 전신 무력감, 환한(피부나)는 환자 위가 느려짐) 등이 나타날 경우(간기능장애), 5) 이 약의 복용으로 인하여 드물게 기침, 숨참, 호흡곤란, 발열 등의 증상이 나타날 사실이 보고된 바 있습니다. 이런 증상이 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고, 의사나 약사와 상담하십시오. 6) 이 약의 복용으로 인하여 발진, 발적, 메스꺼움, 구토, 변지, 설록부진, 배뇨곤란, 어지러움, 호흡곤란, 빈뇨, 배뇨통, 혈뇨, 진뇨관 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하고, 의사나 약사와 상담하십시오 7) 이 약의 복용으로 인하여 출혈이 있을 수 있으므로 자동차나 기계류의 운전조작을 하지 마십시오. 8) 수 차례 복용하여도 증상이 개선되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 의사나 약사와 상담하십시오. 9) 장기연용하지 마십시오

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하십시오.

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 적사일광을 피해 되도록 습기가 적은 곳에 보관하십시오. 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. 4) 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 적사일광을 피해 되도록 습기가 적은 곳에 보관하십시오. 3) 오용을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. 4) 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

● 경고

매일 제정 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.

● 저장방법 : 기밀봉지, 실온보관(1-30℃)



정우신약주식회사

충청남도 대천시 신항로 12-13



제조번호 :
사용기한 :



효과 빠른 기침감기약(비타민C함유)

12캡슐

노노코 캡슐

[12가지 생약과 양약의 복합처방]

오래된 감기
기침·가래·두통
오한·발열..

이 포장은 어린이 보호용 안전 포장입니다. 개봉시 무리한 힘을 가할 경우 내용물 손상이 있을 수 있습니다.

● 원료약품의 분량(1캡슐(520mg)중)

사호(KP).....317mg
반회(KP).....217mg
항균(KP).....133mg
(바이칼린으로서 13.3mg)
인삼(KP).....133mg
(전체노사이드로비으로서 0.27mg)
감초(KP).....80mg
(글리시리진으로서 2.1mg)

대추(KP).....133mg
생강(생약).....50mg
(미상수침건조엑스88, 15mg)
이세브미노프(KP).....150mg
클로르페니라민메틸산염(KP) -- 0.58mg
티라피딘하이드로클로라이드(KP).....12.5mg
카페인(수소산).....12.5mg
아스피린(수소산).....30mg

*본 약약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 약국, 병의원 등의 개성자를 통하여 교환하여 드립니다.



정우신약주식회사

충청남도 대천시 신항로 12-13