

레디비타정

Readyvita Tab.

레디비타정은 비타민 B군을 함유하여 스트레스에 의해 파괴되는 비타민 B군을 보충해 주는 현대인의 종합영양제이며 30세 이후 쇠퇴해 가는 생체 조직의 활성화에 필수적 역할을 하는 비타민 E도 함유되어 있습니다. 또한 비타민C와 빈혈을 치료하는 성분인 푸마르산철과 적혈구 생성에 필수 요소인 엽산을 함유한 복합영양제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

티아민질산염(KP)	15mg
리보플라빈(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	5mg
시아노코발라민(KP)	12μg
폴산(KP)	400μg
아스코르브산(KP)	600mg
토코페롤아세테이트 50%(KP)	60mg
(토코페롤아세테이트로서 30mg)	
d-비오틴(USP)	45μg
니코틴산아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)	20mg
푸마르산철(KP)	82.1mg
(철로서 27mg)	
첨가제(동물유래) : 유당수화물	
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호	

【성 상】 암갈색 장방형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 증상의 완화 : 신경통, 관절통(요(허리)통, 견통(어깨결림) 등), 눈의 피로, 구내염(입안염), 설염(혀염).
2. 다음 경우의 비타민 및 철의 보급 : 영양불량, 소모성질환, 육체피로, 병중 · 병후의 체력저하 시, 임신 · 수유기, 발육기, 노년기.

【용법 · 용량】

성인 1회 1정, 1일 1회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 복용 시 다음 사항에 주의하십시오.

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.
- 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.

4. 복용 중 또는 복용 후는 다음사항에 주의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 이 약의 복용에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있습니다. 출혈이 오래 계속될 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 차광한 기밀용기, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정, 120정

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- * 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사와 상담하시기 바랍니다.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사 · 약사 또는 식품의약품안전청 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성 정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품의 유효기간은 외포용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 : 2014. 12. 05.