

코미정

COMY Tablet

일반의약품



(01)08806703014236

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 :
페닐레프린염산염(KP) 10mg
클로르페니라민말레산염(KP) 4mg
- 첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소, 우지), 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 딸기향코튼, 미결정셀룰로오스, 아스파탐, 인산수소칼슘 수화물, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 합수산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

- 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염(코염)에 의한 다음 증상의 완화 : 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
- 부비동염에 의한 비종혈(코막힘)의 일시적 완화

【용법·용량】

- 만 12세 이상 소아 및 성인 : 4시간마다 1정씩 복용합니다. 24시간동안 6정을 초과하지 않으며 의사의 지시에 따릅니다.
- 만 6세 이상 ~ 12세 미만 : 4시간마다 1/2정씩 복용합니다. 24시간동안 3정을 초과하지 않으며 의사의 지시에 따릅니다.
- 만 6세 미만 소아 : 의사의 지시에 따릅니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미(단맛)제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.
※ 1일 허용량 제한 : 아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것. 60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자
- 2) 특이체질환자
- 3) 수유부
- 4) 중증(심한 증상)의 고혈압환자, 중증(심한 증상)의 관상동맥(심장동맥)질환환자, MAO저해제(억제제) 치료를 받고 있는 환자
- 5) 협우각성 녹내장, 뇨저류(소변이 고임), 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이차거나, 호흡곤란이 있는 환자
- 6) 진정제, 신경안정제를 투여받고 있는 환자
- 7) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다음의 경우에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 만성기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 감작성기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선(전립샘)비대로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 마십시오.

4. 부작용

- 1) 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있습니다. ; 공포, 불안, 긴장, 진전(떨림), 식욕, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관허탈
- 2) 페닐레프린에 과민인 사람은 빈맥(빠른맥), 동계(두근거림), 두통, 어

지러움, 오심(구역)등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있습니다. 그러나, 페닐레프린을 적적량투여하면 이런 부작용이 나타나지 않는 안전한 약물입니다.

- 3) 항히스타민제에 과민인 사람은 중증(심한 증상)도의 진정작용을 나타낼 수 있습니다.
- 4) 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈(목마름), 어지러움, 식욕, 식욕부진, 오심(구역), 구토, 두통, 신경과민, 다뇨(소변량과다)증, 가슴앓이, 복시(겹보임), 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염 나타날 수 있습니다.
- 5) 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등의 졸음을 증가시킬 수 있습니다.
- 6) 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나, 고열을 동반할 때는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약의 복용 중에는 알코올성 음료를 피합니다.
- 3) 이 약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 하십시오.
- 4) 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량복용시에는 의사와 상의합니다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의하십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【저장방법】

밀폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관합니다.

※ 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로

원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【포장단위】

500정

【사용기한】

외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【소비자상담】

080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL:080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최종 개정연월일 : 2022.05.12

코오롱제약