

광동 우황청심원

(사형대체물질 영묘향 함유)

일반의약품 분류번호 : 219 기타의 순환계용약

고혈압, 중풍 등의 구급제(救急製)로 알려졌던 우황청심원은 화제국방에 수록된 이래 우리나라에서는 광해군 2년(1610년)에 허준선생에 의해 편찬된 동의보감에서 그 처방이 정립되었습니다. 본 처방은 시대의 흐름에 따라 과학적으로 그 안전성을 입증해 가며 변천을 거듭하여 현재는 우황, 영묘향, 영강각을 비롯한 27종의 진귀한 약재로 구성된 우리나라만의 고유한 비방입니다. 엄선된 약재만을 가지고 제조한 광동원우황청심원(사형대체물질영묘향 함유)은 최근 임상실험 결과 근자에 더욱 증가한 고혈압 및 뇌졸중 등의 순환기계질환에 우수한 효과가 있는 것으로 나타났습니다.

【원료약품 및 그 분량】1환(7.5g)중

• 산 약(山藥)(KP)..... 263mg	• 당 귀(當歸)(KP)..... 56mg	• 용 뇌(龍腦)(생규)..... 38mg
• 감 초(甘草)(KP)..... 188mg	• 방 풍(防風)(KP)..... 56mg	• 백 엄(白嚴)(생규)..... 28mg
• 글리시리진산으로서 4.7mg)	• 백 출(白朮)(KP)..... 56mg	• 건 강(薑黃)(KP)..... 28mg
• 인삼(人蔘)(KP)..... 94mg	• 시 호(柴胡)(KP)..... 47mg	• 첨가제(결합제) 골쇄왕(骨碎王)..... 3117mg
• 포 황(蒲黃)(생규)..... 94mg	• 길 경(桔梗)(KP)..... 47mg	• 금 박(金箔)(생규)..... 적량
• 신 곡(神麴)(생규)..... 94mg	• 행 인(杏仁)(KP)..... 47mg	
• 대두황권(大豆黃卷)(생규)..... 66mg	• 복 경(茯苓)(KP)..... 47mg	
• 육 계(肉桂)(KP)..... 66mg	• 천 공(川芎)(KP)..... 47mg	
• 아 고(阿膠)(생규)..... 66mg	• 우 화(牛黃)(KP)..... 45mg	
• 각 약(芍藥)(KP)..... 56mg	(결합형 빌리루빈으로서 9.0mg)	
• 맥문동(麥門冬)(KP)..... 56mg	• 영강각(羚羊角)(생규)..... 38mg	
• 황 금(黃芩)(KP)..... 56mg	• 영묘향(靈貓香)(생규)..... 114mg	
	(9-cis-cetone으로서 615.6μg)	

【성상】 황금색 금박을 입힌 구형의 환제

【효능·효과】 뇌졸중(전신불수, 수족불수, 언어장애, 혼수, 정신혼미, 안면(얼굴)신경마비), 고혈압, 두근거림, 정신불안, 급 만성경동, 자율신경실조증, 인사불성

【용법·용량】 보통 성인 1회 1환

1회 8~15세 2/3환, 5~7세 1/2환, 2~4세 1/3환, 1세 이하 1/4환을 1일 1~2회 씹거나 따뜻한 물에 개어서 복용한다.

※ 사용상의 주의사항

- 경고
혈압강하의 목적으로 복용할 경우에는 전문인의 지시에 따라 복용할 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 부종(부기) 환자
 - 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 현재까지 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락타아제 결핍증(lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증: 요양이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배하량에 간혹 1g 이상의 체중은 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 피부: 발진, 발진(종혈되어 붉어짐), 두드러기, 가려움 등
 - 소화기계: 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등
 - 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로르메타이리드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
 - 안면(얼굴)마비, 정신불안, 수족마비, 언어장애의 경우 유효율이 66.7% 이상 나타났다는 임상보고가 있다.
 - 원방우황청심원과 변방우황청심원의 비교임상시험결과에 의하면, 뇌자기공명영상(Brain MRI) 또는 뇌전산화단층촬영(Brain CT)을 실시하여 뇌졸중으로 확인되어 안정기에 있는 환자의 운동장애와 안면(얼굴)마비에 대하여는 원방보다 유의한 효과가 인정되었으나, 언어장애와 의식장애에서는 두 제제간 유의한 차이가 확인되지 않는 등 뇌졸중 증상에 따른 효과의 일관된 차이는 보이지 않았으며, 고혈압, 두통, 머리무거움, 어지러움 등 고혈압 증상의 경우에는 두 제제간 우위를 확인할 수 없다는 임상보고가 있다.
 - 호흡기관에 대한 효능이 입증되지 않아 효능 효과 호흡기관을 삭제하였음.
 - 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 성약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 【포장단위】 1환, 10환

- ※ 제품의 특성상 실온에 보관하여 주십시오
- ※ 광동 우황청심원에 입회하는 금박은 순금으로 약이 되었으나 벗기지 말고 그대로 복용하십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 경화에 의해 환제가 딱딱할 수 있으니 복용시 주의하시기 바랍니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해 드립니다.
- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정 됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품사전 (<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 수신자부담 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품에 대한 문의사항이나 교환은 다음 전화로 연락하시면 됩니다.

【소비자상담실】 ☎ 080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)
작성일자 : 2016. 03. 22

광동제약(주) 경기도 평택시 신단로 114
www.ekdp.com
H1160322-009

Kwang Dong ORIGINAL Woo Whang Chong Shim Won

【Composition:one pill(7.5g)contains】

Dioscoreae Rhizoma	263mg	Attractylodis Rhizoma alba	56mg
Glycyrrhizae Radix	188mg	Bupleuri Radix	47mg
Ginseng Radix	94mg	Platyodi Radix	47mg
Typhae Pollen	94mg	Armeniacae Semen	47mg
Massa Medicata Fermentata	94mg	Bezoar Bovis	47mg
Glycine Semen Germinatum	66mg	Cnidii Rhizoma	47mg
Cinnamomi Cortex	66mg	Hoelen	45mg
Gelatinum	66mg	Antelopis Cornu	38mg
Paeoniae Radix	56mg	Civet Musk	114mg
Liriois Tuber	56mg	Borneolum	38mg
Scutellariae Radix	56mg	Ampelopsis Radix	28mg
Angelicae Gigantis Radix	56mg	Zingiberis Rhizoma	28mg
Saposhnikoviae Radix	56mg	Mel	3117mg
		Aurum	q.s

【Indication】

Cerebral Apoplexy(General Paraplegia, Paralysis of Extremity, Dysphasia, Coma, Mental Confusion, Facial Palsy)
Hypertension, Palpitation, Mental Anxiety, Acute & Chronic Convulsion, Dysautonomia, Insensibility.

【Dosage】

Generally, once or twice a day by chewing or dissolving in warm water

For adults : 1pill per time

For children : 15 ~ 8 years old : 2 / 3 pill, 7 ~ 5 years old : 1 / 2 pill, 4 ~ 2 years old : 1 / 3 pill, 1 year and under : 1 / 4 pill

【 영묘향 우황 청심원 임상 실험 비교 결과 】

▶ 영묘향 이란?

사향 고양이 회음부의 향선낭에서 진한 액상분비물을 채취한 것으로, 예로부터 한방에서 강장, 진정, 안신, 해독, 지통 효과를 목적으로 널리 사용해온 생약 성분의 한약 원료이다.

(관련 문헌 : 분초강목, 신정화한약, 중약대사전, 중국약용동물지, 중초약해본)

(관련 연구 : 경희대학교 한의과대학 부속한방병원 심계내과학교실 임상시험, 서울대학교 천연물과학연구소 비임상시험)

▶ 영묘향 우황청심원 이란?

멸종위기에 처한 동.식물 국제교역에 관한 협약(CITES)으로 사향의 수입이 어려워, 사향을 대체 할 성분이 필요한 상황에서 한방의 원리에 충실하기 위하여 고 문헌에 근거한 생약 성분 영묘향을 대체 원료로 하여 생산한 우황청심원.


광동제약은 사향 청심원과 동등한 효능 발휘를 위하여 사향 함량 대비 영묘향의 함량을 3배로 하여 우황청심원을 생산하고 있습니다.

〈영묘향 및 사향 함유

우황청심원 임상실험 결과〉

- ▶ 경희대 한방병원 임상 진행 (2001년)
- ▶ 사향 대체 물질 함유 청심원과 사향 함유 청심원을 시험약과 대조약으로 식약처 임상 시험 기준에 따라 정식 임상시험 실시
- ▶ 고혈압과 뇌졸중의 비교 임상 시험 결과 동등한 효능 및 안전성이 입증 (평가 지수의 통계적 유의성 없음)

- 강압효과에 대한 비교(T-test) -



광동제약(주)

경기도 평택시 신단로 114
www.ekdp.com