

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

일반의약품

비충혈제거제

분류번호:132

트인[®]비액

TWIN Soln.

감기는 매우 흔한 질병인 만큼 대부분의 사람들이 대수롭지 않게 여기지만, 감기는 만병의 근원이라는 말이 있습니다. 과로와 스트레스로 면역력이 약해질 때, 계절에 상관없이 가장 먼저 나타나는 증상이 감기인 것으로 보아도 알 수 있습니다. 이렇게 감기는 매우 흔하고 오래된 질환이지만 바이러스에 의해 일어나므로 현재로서는 원인요법이 아닌 두통, 코막힘, 목아픔 등의 증상을 치료하는 대증요법을 시행하고 있습니다.

감기의 여러 증상에서 환자가 가장 불편하다고 느끼는 것 중 하나가 충혈과 코막힘으로 인해 코가 멍멍해지는 것입니다. 환자 스스로 매우 답답하다고 느낄 뿐 아니라 충혈과 코막힘은 또한 재채기를 일으키므로 더욱 고통스럽게 느껴집니다.

감기에서 코막힘과 콧물을 나게 하는 대표적인 물질은 히스타민으로 트인비액의 페니라민은 이런 히스타민의 유리를 억제하여 코막힘과 콧물을 효과적으로 억제시켜 줍니다. 그러나 코막힘은 콧구멍의 혈관이 확장되었을 때도 일어날 수 있으며 트인비액의 페닐레프린은 확장된 혈관을 수축시켜 비충혈을 완화시켜 줍니다.

트인비액은 국소적으로 적용하는 제품으로서 단기간 사용할 경우 먹는 약보다 효과적이며 부작용 면에서도 유리한 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

페닐레프린염산염(Phenylephrine HCl)(약전)	5.00mg
말레인산페니라민(Pheniramine maleate)(영국약전)	2.00mg
벤잘코늄염화물액10%(10% Benzalkonium Chloride solution)(약전)	2.00mg
(벤잘코늄염화물로서 0.20mg)	

【성 상】 백색의 플라스틱 용기에 든 무색내지 미황색의 투명한 액

【효능·효과】 감기, 고초열(꽃가루 알레르기 비염), 부비강염, 상기도 알레르기에 의한 비충혈(코막힘)의 일시적 완화. (다른 용도로 사용시에는 심한 부작용이 나타날 수 있습니다.)

【용법·용량】 성인 및 12세 이상 어린이 : 증상에 따라 1일 4시간마다, 양쪽 비강(코안)에 2~3회씩 분무하십시오.

■ 트인비액 사용방법

부작용 위험성을 최소화하면서 최대의 치료효과를 얻기 위해서는 적절한 용량을 사용하는 것이 매우 중요하며, 치료 시작 전에 용법·용량과 사용법을 충분히 숙지하여야 합니다.

처음 사용시 약액이 잘 분사되는지 확인이 필요합니다. 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 10회 정도 눌러주어 약액이 균일하게 분사되는지 확인하시기 바라며, 직전 사용일이 일주일 이상 지난 경우에는 동일한 방법으로 재확인하여야 합니다. 약액이 잘 분사되지 않는 경우에는 분사구의 입구를 물로 깨끗이 씻고 건조시킨 후 사용하시면 되며, 매번 사용 전에는 용기를 잘 흔든 후 아래 그림 및 사용법대로 사용하시기 바랍니다.



1. 용기를 잘 흔들어 준 후, 체일 위의 청색 뚜껑을 엽니다.



2. 코를 풀어 콧 속을 깨끗이 한 후, 한쪽 코를 막고 고개를 앞으로 살짝 숙인 후 그림 2와 같이 병을 잡은 상태(손바닥과 엄지 손가락으로 병을 전 상태에서 검지와 중지로 펌프를 누름)에서 그림 3과 같이 코를 막지 않은 다른쪽 콧구멍으로 분사구를 부드럽게 깊숙히 넣은 후 분사합니다. 분사할 때는 펌프를 확실하게 한 번씩만 눌러주시기 바랍니다.

* 분사시 비종격에 직접 분사되지 않도록 하기 위하여 왼쪽 콧속에 분사할 때는 오른손으로, 오른쪽 콧속에 분사할 때는 왼손으로 분사하십시오.



3. 분사한 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 숨을 내뿜습니다.

4. 막았던 다른 콧구멍 속에도 같은 방법으로 분사한 후, 코로 숨을 가볍게 들이마신 후, 입으로 숨을 내뿜습니다.

5. 마지막으로 청색 뚜껑을 닫습니다.

■ 용기의 청결관리


트인비액의 펌프가 잘 작동하려면 용기를 주기적으로 깨끗이 씻어 청결히 관리하는 것이 중요합니다. 어떠한 경우에도 분사구의 구멍을 찢러서는 안됩니다.



1. 청색 뚜껑을 열고 흰색 분사기를 살짝 위로 밀어서 펌프에서 분사기를 분리하십시오(그림 4).

2. 차가운 수도물로 청색 뚜껑과 분사기를 씻는데, 특히 분사구 부위를 깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 건조시킵니다.

3. 원래대로 펌프를 분사기에 끼우고 난 후 청색 뚜껑을 닫아 보관하십시오.



4. 사용 전에는 시험분사하여 약액이 균일하게 잘 분사되는지 재확인하시기 바랍니다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 성분(특히 벤잘코늄염화물)에 과민증 및 그 병력이 있는 환자.
 - 2) 30개월 이하의 유아
- 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 고혈압, 심장병, 당뇨병, 갑상선기능 항진증, 녹내장 환자
 - 2) 지금까지 비염용 분무제에 의해 알레르기 증상(예를 들면, 발진, 종창(부기), 자극감 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 3) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 4) 소아(경련을 유발할 수 있습니다.)
- 3. 부작용
 - 1) 과민증 : 과민증상이 일어나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
 - 2) 정신신경계 : 드물게 진전(떨림), 불면증이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 코 : 때때로 자극통, 드물게 비루(콧물)증상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 이 약의 투여에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 종창(부기), 자극감 등의 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 4. 일반적 주의
 - 1) 이 약은 과도하게 사용하면 작열감(화끈감), 자극감, 재채기를 일으키거나 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 사용이 과하지 않도록 주의하십시오.
 - 2) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 3) 3일간 투여해도 증상의 개선이 보이지 않을 경우에는 일시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - 4) 장기간 계속하여 투여하지 마십시오.
- 5. 상호작용
MAO억제제의 투여 중에 있는 환자에는 급격한 혈압상승 등을 일으킬 수 있으므로 사용을 피하십시오.
- 6. 임부에 대한 투여
임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 7. 적용상의 주의
 - 1) 이 약을 눈과 귀에는 사용하지 마십시오.
 - 2) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.
 - 3) 변색된 것은 사용하지 마십시오.
- 8. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭달아)하여 보관하십시오.
 - 3) 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 차광한 기밀용기, 25℃ 이하 보관

【포장단위】 15mL

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 이메일을 주십시오.
TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2011. 12. 21)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.	설명서 작성년월일 : '01. 09. 05
	설명서 개정년월일 : '11. 12. 21
	제품의 사용기한은 외부용기에 표기
	P32221-08