



순수 고품량 비타민C 일반의약품

유한비타민씨정

1000mg

분류번호 : 314 (비타민C 및 P제)

개요 및 특징

비타민C는 비타민C 결핍증(괴혈병 등)의 예방 및 치료 뿐만 아니라 비타민C의 요구량이 증가하는 소모성 질환(임산부, 수유부, 병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하시, 육체 피로)에 사용할 수 있는 매우 유익한 생리활성 물질입니다.

최근 들어 비타민C의 효능 및 약리작용에 대해서 그동안 많은 연구자들에 의해 깊이있게 연구되어온 다양한 연구결과들이 대중에게 널리 공개되면서 비타민C는 각종 질환의 치료 및 예방에 큰 도움을 줄 수 있는 중요한 필수 영양소의 하나로 주목받고 있습니다.

유한비타민씨정1000mg은 신용의 상징 유한양행이 정성을 기울여 만든 백색의 비타민C 단일정제로 비타민C를 필요로 하시는 분들이 복용하시기에 좋은 제품입니다.

성분 · 함량 1정 중

아스코르빈산97%과립(비타민C) (별규) ----- 1030.93mg
(아스코르빈산으로서 1,000mg)

성상

백색의 장방형 정제

앞면	뒷면	옆면
1000	Y H	


효능 · 효과

1. 괴혈병의 예방과 치료
2. 비타민C의 요구량이 증가하는 소모성 질환
 - 1) 임신·수유기 및 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
 - 2) 육체피로
3. 다음 질환 중 비타민C 결핍으로 추정되는 경우
 - 1) 잇몸출혈, 비출혈(코피), 혈뇨 등의 모세관출혈
 - 2) 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)
 - 3) 흡수불량

용법 · 용량

성인 : 보통 1/2~1정(아스코르빈산으로서 500~1,000mg)을 1일 1회 또는 수회(여러차례) 분할하여 복용합니다.

충분한 양의 물과 함께 복용합니다.



그림과 같이 정제포장의 볼록한 부분을 화살표 방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다.

이때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
 - 고수산노증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태), 지중해빈혈증 환자
 - 통풍환자 및 시스틴노증 환자
 - Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 결핍환자 : 고용량을 투여할 경우 용혈(적혈구 파괴)을 초래할 수 있습니다.
 - 신장(콩팥)의 수산결석(수산칼슘돌) 환자 : 1일 1g 이상 복용할 경우
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
 - 임신 중, 고용량을 투여할 경우, 신생아의 괴혈병을 초래할 수 있으므로 주의합니다.
 - 과도한 음주나 흡연을 삼가합니다.
 - 이 약의 정제 또는 캡슐제는 충분한 물과 함께 복용하도록 하며 이 약과 식도점막과의 접촉시간이 길어지면 식도염을 일으킬 수 있으므로 복용 후, 바로 눕지 않도록 합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 임부·수유부
 - 신장(콩팥)의 수산결석(수산칼슘돌) 환자
 - 경구(먹는)용 항응고제(쿠마린계 약물)를 복용 중인 환자(먹는)용 항응고제의 반응을 약화시킬 수 있습니다.)
 - 살리실산염, 아스피린, 철분제, 페니토인 및 일부 항전간(간질)제, 에스트로겐이 포함된 경구(먹는)용 피임약, 테트라사이클린계 항생제, 플루페나진, 오르리스타트를 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있습니다.)
 - 바르비탈산 유도체를 복용 중인 환자(이 약의 신장(콩팥)배설을 촉진합니다.)
 - 코르티코스테로이드제를 복용 중인 환자(이 약의 산화를 증가시킵니다.)
 - 흡연자, 만성적으로 알코올을 섭취하는 사람
- 다음과 같은 경우, 이 약을 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오, 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 구역, 구토, 설사, 속쓰림
 - 안면홍조(얼굴 붉어짐), 두통, 불면
 - 과량투여로 인한 신장(콩팥)결석, 요의 산성화, 수산염 결석의 침전
- 기타 이약의 복용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여시키십시오.
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 각종 요당검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
 - 오·남용(잘못사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법

차광한 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

사용기한 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호 #2001, 사용기한 2015년 1월 6일인 경우 → "2001 / 150106"로 표시

포장단위 100정, 200정

- ※ 이 의약품은 KGMP(우수 의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 이 설명서 개정일자(2012년 7월 30일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자 상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.



제조판매원

유한양행

본사 : 서울특별시 동작구 노량진로 74

공장 : 충북 청원군 오창읍 연구단지로 29

소비자 상담실 : 080-024-1188