

아이오브릭스® 주 350 | 이오핵솔 |

- 원료약품 및 그 분량(1mL 중)
주성분 : 이오핵솔(USP)..... 755mg
첨가제 : 에테르산칼슘이나트륨, 트로메타몰, 염산, 수산화나트륨, 주사용수

■ 성 상 : 무색의 바이알에 들어있는 무색 내지 담황색의 맑은 액

■ 효능 · 효과

1. 혈관조영
2. 정맥요로조영(IVP)
3. CT 조영증강
4. 체강조영 : 관절조영, 소화관조영

■ 용법 · 용량

투여용량은 검사방법, 나이, 체중, 심박출량, 환자의 상태, 기술에 따라 달라집니다. 일반적으로 다른 요오드계 X선 조영제와 같은 요오드 농도, 용량을 사용하며, 투여 전후에 충분한 수분공급을 합니다.
추천 투여용량은 다음과 같습니다.

〈정맥조영〉

적응증	농 도	용 량	
정맥요로조영			환자의 체중과 신장상태에 따라 조절
성인	300/350mg/mL	40~80mL	통상 65 ~70mL
소아 < 7kg	300mg/mL	1.5~2mL/kg	통상 60mL
소아 ≥ 7kg	300mg/mL	1.5mL/kg	최대 40mL
사지정맥조영	240/300mg/mL	20~100mL/사지	
정맥 DSA	300/350mg/mL	20~60mL/inj	
CT 조영증강			
성인	240mg/mL 300mg/mL 350mg/mL	125~250mL 100~200mL 100~150mL	30 ~ 60g 30 ~ 60g 35 ~ 52.5g
소아	240mg/mL 300mg/mL	2~3mL/kg 1~3mL/kg	최대 40mL, 드물게 100mL까지 투여

〈동맥조영〉

적응증	농 도	용 량	
동맥조영			
대동맥과 분기동맥조영	300/350mg/mL	30~60mL/inj (최대 250mL)	평균 40mL/inj
선택적 뇌동맥조영	300mg/mL	5~10mL/inj	
대퇴동맥조영	300mg/mL	30~80mL/inj	대동맥-대퇴동맥부는 권고량 중 높은쪽, 직접 대퇴동맥조영술은 낮은 쪽의 양을 선택
심혈관조영			
성인 좌심실 및 대동맥근조영	350mg/mL	30~60mL/inj	
선택적 관상동맥조영	350mg/mL	1.5~8mL/inj	반복주입 시 최대 250mL
소아	300/350mg/mL		나이, 체중, 병리적 상태에 따라 4~6mL/kg으로 조절
동맥 DSA	240/300mg/mL	1~15mL/inj	

〈척추조영〉

적응증	농 도	용 량
요추 및 흉추조영 (요추주입)	240mg/mL	8~12mL
경추조영(요추주입)	240mg/mL 300mg/mL	10~12mL 7~10mL
경추조영(경추주입)	240mg/mL 300mg/mL	6~10mL 6~8mL
CT 뇌수조조영	240mg/mL	4~12mL

이상반응을 최소화하기 위하여 투여용량은 총 요오드로서 3g을 초과해서는 안됩니다.

〈체강조영〉

적응증	농 도	용 량	
관절조영	240mg/mL 300mg/mL 350mg/mL	5~20mL 5~15mL 1~10mL	
ERP/ERCP	240mg/mL	20~50mL	
헤르니아조영	240mg/mL	50mL	헤르니아 크기에 따라 용량 결정
자궁난관조영	240mg/mL 300mg/mL	15~50mL 15~25mL	
침생조영	240/300mg/mL	0.5~2mL	
소화관조영 (경구투여)			
성인	150/350mg/mL	개인에 따라 용량 결정	
소아	300/350mg/mL	2~4mL/kg	최대 50mL
〈직장내투여〉 소아	100~150mg/mL로 희석한 액	5~10mL/kg	예) 이 약 240, 300, 350주사제를 1:1 또는 1:2로 희석

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 속 등 중증의 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 뇌척수강내 투여 시 중증의 이상반응이 나타날 수 있으므로 뇌수조, 척추조영에는 사용하지 않습니다.

2. 다음 환자(경우)에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분, 요오드계 약물에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 중증 갑상선 질환 환자(요오드가 갑상선에 축적되어 증상이 악화될 수 있습니다.)
- 3) 중증 국소감염 또는 균혈증과 같은 전신감염이 있는 환자에 대한 척추조영

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 다음 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 특별히 필요한 경우에는 신중히 투여하십시오.
 - ① 극도의 전신 쇠약 환자
 - ② 기관지천식 환자(이상반응 발현빈도가 높다는 보고가 있습니다.)
 - ③ 중증 심장에 환자(혈압저하, 부정맥, 서맥 등을 일으키고, 증상을 악화시킬 수 있습니다.)
 - ④ 중증 간장에 환자(간기능이 악화될 수 있습니다.)
 - ⑤ 중증 신장에 환자(신기능이 악화될 수 있습니다.)
 - ⑥ 급성 체장염 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
 - ⑦ 마크로글로불린혈증 환자(유사약에서 혈액의 젤라틴상 변화를 초래하여 사망했다는 보고가 있습니다.)
 - ⑧ 다발성골수종 등의 형질세포질환 환자(특히 탈수상태인 경우 신부전을 일으킬 수 있습니다.)
 - ⑨ 감작증 환자(혈중칼슘농도 저하로 증상이 악화될 수 있습니다.)
 - ⑩ 갈색세포종 환자 및 질환 의심자(혈압상승, 빈맥, 부정맥 등의 발작을 일으킬 수 있으므로 조영검사는 피하십시오. 부득이하게 검사를 요하는 경우에는 정맥확보하에 메실산펜톨라민 등의 알파차단제 및 염산프로프라놀롤 등 베타차단제를 준비하여 이들 발작에 충분히 대처할 수 있도록 하고, 환자의 상태를 면밀히 관찰하면서 신중히 투여하십시오.)
- 2) 본인 또는 가족이 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기 반응을 일으키기 쉬운 체질인 환자
- 3) 약물 과민반응의 병력이 있는 환자
- 4) 탈수 증상이 있는 환자(급성신부전을 일으킬 수 있습니다.)
- 5) 고혈압 환자(혈압상승 등 증상을 악화시킬 수 있습니다.)
- 6) 동맥경화증 환자(혈행장애를 악화시킬 수 있습니다.)
- 7) 당뇨병 환자(급성신부전을 일으킬 수 있습니다.)
- 8) 갑상선과다증, 다결절성 갑상선종 등의 갑상선 질환 환자(요오드가 갑상선에 축적되어 증상이 악화될 수 있습니다.)
- 9) 간장에 환자(간기능이 악화될 수 있습니다.)
- 10) 신장에 환자(신기능이 악화될 수 있습니다.)
- 11) 소아
- 12) 고령자, 쇠약자
- 13) 중추신경계 질환 및 경련의 병력이 있는 환자(경련이 일어날 수 있습니다.)
- 14) 약물중독 환자(발작역치가 감소될 수 있습니다.)
- 15) 급성 또는 만성 알코올중독 환자(발작역치가 감소될 수 있습니다.)
- 16) 중증 근육경증 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 17) 폐동맥고혈압 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약과 관련된 중대한 이상반응은 다음과 같습니다.
 - ① 속(지연성 포함)을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 실신, 의식소실, 호흡곤란, 호흡정지, 심정지 등의 증상이 나타나면 적절한 처치를 하십시오. 또한, 경증의 과민반응도 중증으로 진행될 수 있으므로 충분히 관찰하십시오.
 - ② 아나필락시양 반응 : 호흡곤란, 안·후두부종, 얼굴부종 등 아나필락시양 반응(지연성 포함)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
 - ③ 급성신부전이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
 - ④ 경련발작이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 항경련제를 투여하는 등 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑤ 폐부종, 폐동맥고혈압이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑥ AST, ALT, γ-GTP 상승 등의 간기능 장애와 황달이 나타날 수 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑦ 심실세동, 관상동맥연축이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑧ 피부 : 스티븐스-존슨증후군(피부정맥만증후군)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고, 발열, 홍반, 가려움, 눈충혈, 구내염 등의 증상이 나타나면 경우에는 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑨ 드물게 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑩ 속에 동반되는 의식소실, 실신이 나타날 수 있으므로 검사종료 후 의식수준을 확인하는 등 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
 - ⑪ 일시적인 마비, 실신, 의식소실 등의 신경계 이상반응이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 필요 시 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 일반적인 이상반응
 - ① 과민반응 : 때때로 발진, 발적, 두드러기, 가려움 등이 나타날 수 있습니다.
 - ② 순환기계 : 미주신경반응(혈압저하, 서맥 등), 발열, 드물게 혈압상승, 빈맥, 부정맥, 안면蒼백, 심계항진이 나타날 수 있습니다.
 - ③ 호흡기계 : 천식발작, 드물게 호흡곤란, 기침, 재채기, 안·후두부종, 코막힘이 나타날 수 있습니다.
 - ④ 정신신경계 : 두통, 일시적인 시력장애, 졸림, 건망증, 드물게 어지러움, 무력감이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 소화기계 : 설사, 복부불쾌감, 때때로 구역, 구토, 드물게 복통, 구갈이 나타날 수 있습니다.
 - ⑥ 기타 : 관절통, 발한, 드물게 권태감, 발열, 추위, 흉부불쾌감, 식은땀, 경미한 온감, 일시적인 금속성 맛이 나타날 수 있습니다.
- 3) 혈관조영
 - ① 말초혈관조영 시 말단부의 통증이나 열감이 나타날 수 있습니다.
 - ② 신장 : 혈청크레아티닌이 일시적으로 상승할 수 있으나, 임상적인 의미는 없습니다. 신부전은 매우 드물지만 고위험군에서는 발생할 수 있으며, 이로 인한 사망이 보고되었습니다.
 - ③ 순환기계 : 관상동맥, 뇌동맥, 신동맥에 투여 후 동맥연축으로 인한 일시적인 허혈이 발생할 수 있습니다. 드물게 심정지, 부정맥, 심기저저차, 허혈증상과 같은 중대한 이상반응도 나타날 수 있습니다.
 - ④ 중추신경계 : 드물게 경련, 일시적 운동장애 또는 감각이상 나타날 수 있습니다. 매우 드물지만 조영제가 뇌혈관관로를 통과하여 대뇌피질로 유입될 수 있습니다. 이로 인해 검사 다음날까지도 CT영상에서 확인될 수 있으며, 일시적 착각이나 대뇌피질성 시각 이상이 나타날 수 있습니다.
 - ⑤ 정맥조영 시 드물게 혈전정맥염이나 혈전증, 관혈통이 나타날 수 있습니다.
 - ⑥ 기타 : 갑상선 증대증, 홍조, 주사부위 반응이 나타날 수 있습니다.

4) 척수조영

- 가) 정상 혹은 이상 부위는 두통인데, 이것은 등의 통증, 목의 경직과 통증, 구역, 구토를 동반할 수 있습니다. 두통은 조영제의 직접 작용 또는 천자부에서의 뇌척수액 손실에 의하여 발생하고, 대부분 투여 후 24시간 이내에 사라지지만, 드물게 수일간 지속되기도 합니다. 두통을 줄이려면 뇌척수액의 손실을 막는 것보다는 체위조절이 더 효과적입니다.
- 나) 구역과 구토는 두번째로 흔히 발생하는 증상으로 정상적인 수분공급이 매우 중요하고, 페도타이징에 약물의 사용은 추천되지 않습니다.
- 다) 때때로 주사부위의 경미한 국소통증이나 감각이상, 요골통증이 나타날 수 있습니다. 드물게 하지의 경련과 통증이 나타납니다.
- 라) 때때로 눈부심, 수막증의 증상을 보이는 수막지각증상이 나타날 수 있습니다. 드물게 진성 화학성수막염이 나타날 수 있고, 감염성수막염의 가능성도 고려해야 합니다.
- 마) 드물게 경련, 일시적 착란, 일시적 운동장애 또는 감각이상 등을 포함하는 일시적 뇌기능 장애가 나타날 수 있습니다. 소수의 환자에서는 EEG상 변화가 보고되었습니다.
- 바) 기타 : 일시적 시각소실, 목통증, 주사부위반응이 나타날 수 있습니다.

5) 체강조영

- 내사경색형혈관조영(ERCP) 후, 약간의 이물감아래서 수치 상승은 빈번히 발생한다. 드물게 ERCP 후 신장의 조영증강이 나타날 수 있는데, 이것은 ERCP후 혈장염의 위험 증가와 관련이 있습니다. 드물게 과사상 혈장염도 보고되었습니다.
- ② 소화관조영 : 위장관 불쾌감이 나타날 수 있습니다.
 - ③ 자궁내관조영 : 일시적인 하복부통이 나타날 수 있습니다.
 - ④ 관절염 : 검사 후 통증이 빈번히 나타나지만, 영백한 관절염은 드물다. 이러한 경우 감염성관절염의 가능성을 고려해야 함이다.
 - ⑤ 헤르니아조영 : 검사 후 경증의 통증이 빈번히 나타남이다.
- 국내 유해사례 보고자료(1989~2010년)를 검토 분석한 결과 다른 약품에서 발생한 유해사례 보다 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아님이다.
- 피부 및 부속기관 : 혈관부종
 - 중추 및 말초신경계 : 발작성

5. 일반적 주의

- 속 등의 발현에 대비하여 충분한 문진을 하십시오.
- ② 드물게 두어량 및 투여방법과 무관한 발한반응이 나타날 수 있습니다. 속 등 중증의 이상반응은 요도 과민반응에 의한 것으로만 한정되지 않으며, 이를 확실하게 예견할 수 있는 방법이 없으므로 반드시 급구제 준비를 하십시오. 중증의 이상반응은 이전에 요도제 과민반응에 대한 이상반응 병력을 가진 사람이나 일련적 알레르기 질환(천식, 조혈, 음식 알레르기 등)이 있는 사람 또는 알레르기 반응을 일으키기 쉬운 체질을 가진 사람에게서 위험성이 증가됩니다.
- ③ 투여 전 예시환자 중증 이상반응을 항상 예견할 수 있는 것이며, 예시환자 자체가 환자에게 위험할 수도 있습니다. 요정제 투여 전에 알레르기 및 과민반응의 병력을 알아보는 것이 예시환자 결과보다 이상반응의 잠재적 위험을 예견하는데 더 정확한 수 있습니다. 알레르기나 과민반응의 병력이 있는 환자에게 요정제를 사용하여 고위험 알레르기 반응의 가능성을 피하거나 최소화하기 위해서 환자에게서 항히스타민제나 코르티코이드를 전두여할 수 있습니다. 이런 전두여로 생명을 위협하는 반응을 예방할 수는 없으나, 발생 빈도와 증상의 중증도를 줄일 수는 있습니다.
- ④ 투여 시 환자의 혈청지표 및 상태를 관찰하고, 과민반응의 발현에 주의하면서 신중하게 투여하며, 이상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- ⑤ 요도제 혈관주입제 사용은 특별한 시술을 갖춘 곳에서 숙련되고 경험있는 전문가의 관리 하에서 실시해야 합니다. 중증 지연성 이상반응이 일어날 수 있으므로 투여 후 적어도 30-60분간 숙면 유도인과 응급치료가 준비된 곳에서 환자를 관찰하십시오.
- ⑥ 외과환자에게 투여할 경우에는 투여제 후 1시간 ~ 수 일 후에라도 지연성 이상반응이 나타날 수 있음을 환자에게 설명한 후, 구역, 가슴통증, 등통증, 발열, 발진, 두드러기, 가려움 등 이상반응이 의심되는 증상이 나타날 경우에도 신속히 의사와 상담하도록 하는 등 충분히 설명하십시오.
- ⑦ 검사 전 탈수상태는 위험하며 진행될 혈관질환 환자, 당뇨병 환자, 신질환을 가진 고령자, 유 · 소아 등에서 급성신부전을 일으킬 수 있으므로 이 약의 투여 전에 충분한 수분을 공급해야 합니다.
- ⑧ 드물게 지연성 이상반응이 나타날 수 있으므로 자동차 운전이나 기계작업 등의 위험한 기계조작은 요정제 투여 후 24시간 동안은 피하는 것이 바람직합니다.
- ⑨ 급성신부전을 예방하기 위한 조치로서 다음 사항을 고려할 수 있습니다.
- ① 고위험군 환자만을 확인하십시오.
 - ② 충분히 수분보급을 하고, 필요하면 시술 전부터 요정제가 신장을 통해 완전히 배설될 때까지 수분을 정맥주입하십시오.
 - ③ 요정제가 완전히 배설될 때까지 신독성이 있는 약물, 경구용 담낭요정제, 동맥직장요정제(arterial clamping), 신동맥성혈관, 큰 수술은 피하는 것이 좋습니다.
 - ④ 요정제의 반복투여는 신기능이 정상으로 회복된 후에 시행하십시오.
- ⑩ 드물게 이 약의 혈관과 유허로 국소통증이나 부종이 나타날 수 있으며, 대개 후유증없이 회복되지만 염증이 조직괴사가 나타날 수도 있습니다. 요정제가 혈관외로 유출된 경우에는 그 부위를 다른 부위보다 두 배 하고 냉찜질을 하십시오. 구획증후군이 발생하면 수술적 감압도 필요합니다.
- 1) 척수요정 시 주의사항
- ① 경련이 있는 환자의 항경련요법은 그대로 유지해야 하고, 경련이 발생하면 디아제팜 또는 페노바르비탈 등의 항간간제를 정맥주사 합니다. 현재 항간간제를 투여하고 있지 않은 경련의 병력이 있는 환자는 검사 전 항간간제를 전두여하는 것이 바람직합니다.
 - ② 혈청 뇌척수액이 보이면 검사의 유익성이 위험성보다 큰 경우에만 실시하십시오.
 - ③ 다른 척수요정제에 대한 검사나 운동성 발작은 이 약에서는 good to bad 없으나, 조영술의 종류, 시술의 오차, 경련의 병력, 부주의에 의한 과열과 투여, 고농도 조영제의 두개내 진입 또는 확산, 신경이완제 또는 페도티아진제 진도제의 투여, 검사 후 머리를 올린상태로 두지 않은 경우, 시술 후 심한 운동 등의 위험요인을 감안하여 주의하도록 하십시오.
 - ④ 척수요정 후 처음 1시간 동안 환자의 머리와 흉부를 20° 올려 쉬게 하십시오. 그런 다음 환자해제 시키는 것은 가능합니다. 아래로 몸을 구부리지 않도록 합니다. 계속 누워 있을 것이라면 처음 6시간 동안 머리와 흉부를 위로 올리도록 합니다. 발작 역치가 낮은 것으로 의심되는 환자는 이 시간 동안 잘 관찰해야 합니다. 척수요정은 입원환자에게만 실시합니다.

6. 상호작용

- 1) 이 약을 비구아이드제 혈당강화제(영산메트포르민, 영산부민 등)와 병용투여 시에는 유산산중독을 일으킬 수 있으므로, 이를 예방하기 위해 조영제를 투여하기 전에 비구아이드제 약물의 복용을 중단하고, 혈청크레아티닌을 측정하며, 충분한 수분공급을 해야 합니다.
- ① 정상 신기능 환자 : 조영제를 투여할 시점에 비구아이드제 약물의 복용을 중단하고 조영 검사를 마치고 48시간 후 또는 신기능이 정상화 된 후 복용을 재개합니다.
- ② 비정상 신기능 환자 : 비구아이드제 약물의 복용을 중단하고 48시간 이후에 조영 검사를 합니다. 신기능(혈청크레아티닌)에 변화가 없을 때에만 복용을 재개합니다.
- ③ 신기능이 비정상이거나 회복인된 응급상태의 환자 : 조영제 사용의 유익성과 위험성을 고려하여 주의깊게 사용합니다.
- 2) 발작 역치를 감소시킬 수 있는 신경마비, 항우울제(MAO억제제 및 삼환제 항우울제 등), 진통제, 페도라티진계 약물(항히스타민제, 항구토제 등), 중추신경흥분제, 정신활성제는 검사 48시간 전에 투여를 중지해야 합니다. 또한, 검사 후 24시간까지 재투여해서는 안됩니다.
- 3) 인투루 2주 의 과민반응과 이상반응(발진, 발열, 인플루엔자 유사 증후군, 저혈압, 빈혈, 신부전 등)이 조영제 투여로 인해 상승 증상을 나타낼 수 있습니다. 이와 유사한 현상이 인터페론과 같은 다른 면역조절물질에서 보고되었으므로, 이러한 약물을 투여 중인 환자는 약물을 중단하고 최소 2주 이후에 조영제 검사를 실시하십시오.
- 4) 베타차단제를 투여받고 있는 환자는 이 약으로 인한 과민반응이 발생하는 경우 심혈관계의 보상작용이 줄어들어 과민반응이 악화될 수 있습니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 랫트와 도끼를 이용한 동물실험에서 사람치로 용량의 100배에 이르는 용량에서도 생식능이나 태아독성의 증거는 없었습니다.
2) 임부에 대한 이 약의 안전성이 확립되어 있지 않고, 이 약을 투여한 후에 X선을 조사하게 되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 진단상의 유의성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
3) 랫트를 이용한 전염병 동물 동물실험에서 중독 증상의 이형이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여할 경우에는 일시적으로 수유를 중단하십시오.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로, 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.

9. 고려자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어있는 경우가 많으므로, 투여 시 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하십시오.

10. 임상검사치에의 영향

감상생기능검사 등의 방사성요오드에 의한 진단이 필요한 경우에는 이 약을 투여하기 전에 실시합니다. 또한, 이 약을 투여한 후 1개월 동안은 검사결과에 영향을 미칠 수 있으므로 방사성요오드에 의한 검사를 실시하지 않습니다. 그러나 요오드와 무관한 T3 resin 섭취 또는 티록신면역억제 등은 영향을 받지 않습니다.

11. 과량투여시의 처치

- 전반심사시험 결과 이 약의 안전영역은 넓고, 혈관내 투여에 대한 상한선은 확립되지 않았습니다. 정상적인 신기능을 가진 환자는 체중 kg당 요오드로서 2,000mg을 초과하지 않는 한 과광투여의 증상은 나타나지 않을 것으로 보입니다.
- 과광투여 시 소변과 전혈지 보정치의 대응오차를 무시하고, 적어도 3일간 신기능을 모니터링합니다. 과광 시 혈액투석을 실시할 수 있습니다.

12. 적용상의 주의

- 1) 전처리
 - ① 투여 전에 약액을 미리 체온 정도로 따뜻하게 가온하십시오.
 - ② 투여 전에 수분제한은 하지 않습니다.
 - ③ 정맥요조영 시는 검사 전에 장내 가스를 배제하고 검사종료까지 금식시키십시오.
- 2) 투여 시
 - ① 비배액주사에 의한 혈관통증, 혈전성정맥염이 나타날 수 있으므로 주의하십시오.
 - ② 비이온성 조영제의 함량과 작용은 이온성 조영제에 비해 약한 것이 in vitro 시험에서 확인되었으므로 혈관조영 시 혈전 및 색전의 위험을 최소화하기 위해 카테터 내를 자주 세척하십시오. 또한, 약액 주입시 주사가 또는 카테터 내 혈액과 이 약과의 접촉이 장시간 이루어지지 않도록 주의하십시오.
 - ③ 할라스타민제 또는 코르티코이드와 혼합투여 시 배합변화를 일으킬 수 있으므로 병용 시에는 각각 분리해서 투여하십시오.
 - ④ 할수로 혈관으로 조영제가 누출된 경우에는 발적, 종창, 물집, 혈관통증 등이 나타날 수 있으므로 주입 시 충분히 주의하십시오.
- 3) 투여 후 충분한 수분보급을 하여 조영제의 신속한 배설을 촉진하십시오.
- 4) 가뭄 후 즉시 투여하고, 1회용으로만 사용하여 남은 약은 폐기하십시오.
- 5) 다른 약물을 조영제 주사와 혼합 투여하지 않습니다.
- 6) 이 약을 사용하기 전에 육안으로 관찰하여야 하며, 변색이 되었거나 미립자결정 포함이 관찰되는 경우, 또는 용기에 결함이 있는 경우에는 사용하서는 안 됩니다. 이 약은 사용 직전에 수기로 옮겨야 합니다.
- 7) 500mL 제형은 자동주입기에 연결하여 사용합니다. 비이알의 고무마개는 1회만 공통하도록 하고, 자동주입기와 환자를 연결하는 도관은 각각의 환자마다 교체하십시오. 자동주입기 제조사의 지침을 준수하십시오.

13. 보관 및 취급상의 주의사항

이 약은 30°C이하에서 차광보관하여야 합니다. 유리바이알은 37°C에서 사용 전 최대 3개월까지 보관할 수 있습니다. 폴리프로필렌병 제품은 37°C에서 사용 전 최대 1개월까지 보관 할 수 있습니다.

14. 기타

이 약에 의한 발암성 여부는 장기간의 동물실험으로 평가하지 못하였습니다.

- **저장방법** : 밀봉용기, 실온보관(1~30℃)
- **포장단위** : 30mL, 50mL, 100mL, 130mL, 150mL, 500mL
- **제조원** : (주)태준제약 본사: 서울특별시 용산구 대사관로31길 8
 공장: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30
- **판매원** : (주)아큐젠 서울특별시 용산구 대사관로31길 6

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서를 꼭 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

※ 이사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 이약품 용어 설명 및 기타 자세한 이약품정보는 온라인 이약드서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 허버트에서 리제디지 약용 이사반응이 나타난 경우 의사나 약사 또는 화제의약품안전관리원 (www.drugsafe.or.kr) → 의약품안전시스템에 알려주시길요.

※ 소비자문의 : (주)테코피아 66511 (03)300-0371

※ 소비자문의 : (주)태준제약 CS팀 02)799-0271

※ 이 첨부문서의 작성년월일은 2002년 4월 1일이며, 개정년월일은 2015년 6월 15일입니다.

태준세약홈페이지 (www.taejoon.co.kr)나 전화번호 [(02) 777-1111]을 통하여