

일반의약품
분류번호:316

말초신경염 · 신경마비치료제

벤포렉스 캡슐

500캡슐

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

- 유효성분: 벤포티아민(KP) 69.15mg
(티아민염산염으로서 50mg)
피리독신염산염(KP) 50mg
시아노코발라민(KP) 0.5mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】

담홍색 분말이 든 상부 미황색, 하부 농황색 경질캡슐제

【효능·효과】

1. 본제에 함유되어 있는 비타민류의 수요가 증대하여 식사로부터의 섭취가 불충분할 때의 비타민의 보급(소모성 질환, 임신부, 수유부) 등
2. 다음 질환의 본제 함유 비타민의 결핍 또는 대사장애가 추정되는 경우 : 신경통, 근육통, 관절통, 말초신경염(알코올성, 당뇨병성), 말초신경마비

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 1~2회 복용한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락 토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 복용시 다음 사항에 주의하십시오. 1) 정해진 용법·용량을 지키십시오. 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오. 3) 이 약은 황색 5호 (선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.
3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하십시오. 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상담하십시오. 2) 드물게 발진, 가려움증 등의 과민증이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 3) 때때로 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다. 4) 이 약에 함유되어 있는 비타민 B₆가 레보도파의 작용을 약화시킬 수 있습니다.
4. 보관 및 취급상의 주의 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사

일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【최종 개정연월일】 2017. 08. 01

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. 최종 개정연월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:

26 × 14

제조원

dalim 다림바이오텍

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107

대표전화: 02) 335-1656

공장 및 연구소: 031) 353-6091

소비자상담실: 080) 333-1656 (수신자부담)

K G M P
적격업체