

텔비트 점안액

(오픈룩사신)

전문의약품	
KGMP	의약품 131
우수 의약품 지정업체	분류번호 안과용제

【성분·含量】 1ml 중
오픈룩사신(USP).....3mg
첨가제(보존제):벤잘코늄염화물(KP).....0.025mg
첨가제(등장화제):염화나트륨(KP)
첨가제(pH조정제):염산(KP)
첨가제(pH조정제):수산화나트륨(KP)
첨가제(용제):말균정제수(KP)

【성상】 무색 투명한 병에 든 미황색 내지 담황색의 투명한 액

【효능·효과】
<유효균종>
본제 감수성의 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 장구균속, 소구균속, 모락셀라속, 간균속, 클렙시엘라속, 세라치아속, 프로테우스속, 모르가넬라 모르가니, 프로비덴시아속, 헬호균속[인플루엔자균, 헤모필루스 애집티우스(Koch-Weeks bacillus)], 슈도모나스속, 녹농균, 박테로이 세파시스, 스테트로포모나스(산토모나스)알로필리아, 아시네토박터속, 프로피오니박테리움아크네스
<적응증>
안검염, 누낭염, 맥립종, 결막염, 감관선염, 각막염(각막궤양을 포함), 안과 수술 전후의 무균화 요법

【용법·용량】
1회 1방울 1일 3회 점안합니다.
증상에 따라 적절히 증감합니다.
수술후 감염증 : 수술전 2일간 1일 5회 점안, 수술 당일에는 수술의 시각, 수술의 종류에 따라 적의 점안하고 수술 직후에 1회 점안, 이후는 포대 교환시 매회 점안합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약 및 귀눈렌즈에 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자
2. 부작용
1) 속 : 드물게 속양 증상(구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 확인되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 과민증 : 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관 부종(인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적·부종, 피부발적, 결막출혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
3) 눈 : 때때로 일시적인 적열감 등 자극감, 불쾌감이, 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적 결막염 및 각막염, 안구 주위 및 안면 부종, 이물감, 눈부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비만성 표층각막염 등의 각막장애 및 독성표피괴사로까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어 날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우 투여를 중지한다.
4) 기타 : 청각장애, 때때로 자각증상이 일어나는 경우가 있다.
3. 일반적 주의
1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
2) 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과민 성장을 초래할 수 있으므로 장기사용하지 않는다. 중복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대처한다.
3) 치료중에는 소프트콘택트렌즈의 착용을 피한다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 사용기간 : 제조일로부터 24개월
뒷면이어짐>>

【포장단위】 5ml, 6ml

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의
1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 점안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
6. 뚜껑을 잘 닫아 보관하시고 치료 종료후 남은 점안액이 있을시 이후 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



최종개정년월일: 2008. 09. 06
작성년월일: 2013. 10. 28

※ 이 첨부문서 작성일자(2013년 10월 28일)이후 변경된 내용은 <http://www.daewoopharm.com>나 051-204-3831(대우 제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지한다.
5. 소아에 대한 투여
1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
6. 적용상의 주의
1) 점안용으로만 사용한다.
2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.