

유니자임 정

조제용

일반 의약품

분류번호 232

소화 · 제산작용의 복합제

UNIZYME Tablets

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

메타규산알루미늄산화마그네슘(건조물로서)(KP)-----	40mg
(산화알루미늄으로서 12.9mg, 산화마그네슘으로서 5.1mg)	
탄산수소나트륨(KP)-----	50mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제 2000Ⅳ(KP)-----	20mg
(전분당화력(pH4.5)278단위, 전분호정화력(pH4.5) 840단위, 단백소화력(pH3.0) 170단위)	
스코폴리아엑스(KP)-----	5mg
(총알칼로이드(히요스시아민 및 스코폴아민으로서) 0.05mg)	
리파제Ⅱ(KP)-----	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45단위)	
감초가루(생규)-----	25mg
(글리시리진산으로서 0.625mg)	
침강탄산칼슘(KP)-----	100mg
트리메부틴말레산염(KP)-----	50mg
첨가제(타르색소) : 황색 203호 (AL), 청색 1호 (AL)	

■ 성 상 : 녹색 내지 연녹색의 원형 필름코팅정제

■ 효능 · 효과 : 소화성 장애에 따른 다음 증상의 개선 : 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(위체(체함)), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량

■ 용법 · 용량 : 성인 1회 2정, 1일 3회 매 식간 복용합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 투석요법을 받고 있는 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.

- 1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
- 3) 신장장애(신장장애) 환자
- 4) 간장애 환자
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 6) 인산염 저하가 있는 환자

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종(부기)이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감소로서 1g이상인 제제는 장기연용(계속 복용(사용))할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.

- 3) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의하십시오.

칼륨함유제제, 칼초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.

6. 이상반응

- 1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 4) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 간장: 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있습니다.

7. 일반적 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킵니다.
- 2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 3) 장기연용(장기복용)을 하지 않습니다.
- 4) 신장병(콩팥병)의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

8. 상호작용

위장진통 · 진경제와 병용(함께) 투여하지 않습니다.

9. 소아 · 임부에 대한 투여

- 1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않습니다.
- 2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않습니다.

10. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉(뚜껑을 꼭 닫아 마개로 막아)하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ 저장방법 : 차광, 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 : 500정/병

■ 제조원 : (주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 · 환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일(2017년 01월 17일)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실 (080-611-8690 수신자부담)으로 문의하시어 확인할 수 있습니다.



제조발매원

(주)동구바이오제약

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

www.dongkoo.com