

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

첨부문서 작성일자 : 2023년 5월 25일

BORYUNG

지친 목의 기관지 솔루션

용각산쿨

과립

일반의약품
품목기초코드
200101057

원료약품 및 그 분량 1포(700mg)중

- 복숭아향
유효성분 : 길경가루(생규) 14.0mg, 세네가가루(생규) 0.7mg, 감초가루(생규) 17.0mg, 행인가루(별규) 2.5mg, 인삼가루(생규) 14.0mg, 아산약가루(JP) 1.4mg, 노스카핀(KP) 5.0mg
첨가제(타르색소) : 적색40호 기타 첨가제 : L-멘톨, 감자전분, 메타규산알루미늄산마그네슘, 에리스리톨, 푸마르산일나트륨, 향료(복숭아향 N-32479)
- 민트향
유효성분 : 길경가루(생규) 14.0mg, 세네가가루(생규) 0.7mg, 감초가루(생규) 17.0mg, 행인가루(별규) 2.5mg, 인삼가루(생규) 14.0mg, 아산약가루(JP) 1.4mg, 노스카핀(KP) 5.0mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유) 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색5호
기타 첨가제 : D-만니톨, L-멘톨, 감자전분, 동클로로필린나트륨, 메타규산알루미늄산마그네슘, 백당, 시트랄, 푸마르산일나트륨, 향료(Clara SP-0019-R), 향료(dl-Borneol), 향료(Lemon Clear Essence G-2371), 향료(드링크향 N-32505)
- 블루베리향
유효성분 : 길경가루(생규) 14.0mg, 세네가가루(생규) 0.7mg, 감초가루(생규) 17.0mg, 행인가루(별규) 2.5mg, 인삼가루(생규) 14.0mg, 아산약가루(JP) 1.4mg, 노스카핀(KP) 5.0mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호 기타 첨가제 : L-멘톨, 감자전분, 메타규산알루미늄산마그네슘, 블루베리향료 RX-9733, 산화티탄, 에리스리톨, 푸마르산일나트륨
- 민트커피향
유효성분 : 길경가루(생규) 14.0mg, 세네가가루(생규) 0.7mg, 감초가루(생규) 17.0mg, 행인가루(별규) 2.5mg, 인삼가루(생규) 14.0mg, 아산약가루(JP) 1.4mg, 노스카핀(KP) 5.0mg
첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호 기타 첨가제 : L-멘톨, 감자전분, 메타규산알루미늄산마그네슘, 민트커피 향료 RX-K307, 에리스리톨, 푸마르산일나트륨

- 성상
- 복숭아향 : 특유의 방향과 단맛·신맛 및 청량감을 가지고 있는 적색의 과립제
 - 민트향 : 특유의 방향과 단맛·신맛 및 청량감을 가지고 있는 녹색의 과립제
 - 블루베리향 : 특유의 방향과 단맛·신맛 및 청량감을 가지고 있는 밝은 회색의 과립제
 - 민트커피향 : 특유의 방향과 단맛·신맛 및 청량감을 가지고 있는 연한 갈색의 과립제

효능·효과 기침, 가래, 인후[목구멍]의 염증에 의한 인후[목구멍]의 목심, 통증·부기, 볼레강

용법·용량 성인 및 15세 이상 청소년 : 1회 1포 11세이상 15세미만 : 1회 2/3포
7세이상 11세미만 : 1회 1/2포 3세이상 7세미만 : 1회 1/3포
3세미만은 복용하지 마십시오. 1일 3~6회, 물없이 복용합니다. 복용간격은 2시간 이상으로 합니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람

- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 3세 미만의 소아
- 이 약은 유당[젖당]을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. ('민트향'에 한함)
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 다른 진해[기침을 그치게 함]거담제[가래약], 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉피부염, 알레르기비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장질환, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자
 - 심장질환 및 고혈압 환자, 고령자[노인]
 - 수유부
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 부종[부기가] 있는 환자
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. ('민트향' 및 '민트커피향'에 한함)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 발진, 발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 구역, 구토, 식욕부진, 어지럼 등
 - 위알도스테론증 : 요양이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
 - 근병증[근육병증] : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증[근육병증]이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법, 용량을 잘 지켜십시오.
 - 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용하십시오.
 - 복용시에는 음식물 마시지 마십시오.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이디드)와 병용[함께사용]시 위알도스테론증이나 저칼륨증으로 인하여 근병증[근육병증]이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여[뚜껑을 꼭 닫아] 보관하십시오.
 - 오용[잘못사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 10포, 18포, 50포

- ※ 만약 구입 당시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.boryung.co.kr 또는 소비자상담실에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관(14-3330/1644-6223)에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.

소비자상담실 수신자부담전화 : 080-708-8088

첨부문서 작성일자 : 2023년 5월 25일

BORYUNG

제조 및 판매자 : (주)보령 경기도 안산시 단원구 능안로 107, 109