

어린이 보호용
안전포장 도입!

콧물, 코막힘, 재채기, 발열

프리노즈 정

감기는 바이러스가 주위 환경의 급작스런 변화 등에 의해 인체의 면역성이 저하될 때 상기도 계통에 침입하여 유발되는 것으로 콧물, 코막힘, 재채기, 기침, 가래, 인후(목구멍)통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통 등의 증상으로 발전하게 되며 이를 방지하면 세균에 의한 2차 감염증으로 악화될 수 있습니다. 따라서 감기는 증상에 맞게 적절히 치료하여, 감기로 인한 몸의 저항력 약화 및 합병증의 유발을 신속히 차단, 제거하는 것이 중요합니다.

일반약품 프리노즈정은 수도에페드린염산염과 클로르페니라민말레산염의 복합처방으로 중증의 코감기에 강력한 효과를 나타냅니다. 특히 열과 통증을 동반하는 코감기에 우수한 효과를 나타냅니다.

성분·함량

1정 중

아세트아미노펜(KP) 500mg

수도에페드린염산염(KP) 30mg

클로르페니라민말레산염(KP) 2mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 오파드라이31F40501(청색1호 알루미논레이크, 청색2호 알루미늄레이크)

성상

청색의 장방형 필름코팅정제

약리작용

1. 프리노즈정은 α -adrenergic agonist로 혈관을 수축시켜 비출혈(코막힘)을 제거하는 수도에페드린염산염, 가장 강력한 H₁ antagonist로 급성 알러지에 유효한 클로르페니라민말레산염이 아세트아미노펜에 복합처방되어 있습니다.
2. 프리노즈정은 해열·진통효과를 나타내는 아세트아미노펜에 콧물, 코막힘, 재채기에 약효를 나타내는 성분의 보강으로 발열, 통증을 동반하는 진행성, 중증(심한 증상)의 코감기에 복용시 우수한 효과를 나타냅니다.

효능·효과

감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

용법·용량

성인 및 12세 이상의 어린이: 매 6시간마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없습니다.

사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람)
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친, 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이.
- 4) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람.
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담(가래)약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발)이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포(물집) 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배노곤란, 현기증(어지러움)등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 3) 수화 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 4) 장기 연용(계속 복용)하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장 방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위

자사포장단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※설명서 개정연월일 : 2010.10.15

P1011-06

포장
개봉
방법



※앞부분을 위에서 강하게 눌러
호일로 부터 알약을 꺼냅니다.



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr