



안전한 빈혈치료제

모아웨린[®] 캡슐

(폴리사카리드철착염)

분류번호 : 322<무기질제제>

개요 및 특징


모아웨린캡슐은 기존의 일반캡슐과 달리 펠렛체형으로 위장관내에서 균등하게 분산되어 약물흡수의 개인차이를 줄였으며, 신속하게 분산되므로 점막자극을 감소시켜 부작용을 최소화 시켰습니다. 특히 철분제제는 소장의 최상부에서 대부분이 흡수되는 것으로 알려져 있는데, 펠렛체제는 위장관내에서 균등하게 분산되므로 약물의 흡수를 극대화시키고 따라서 빈혈치료에 매우 좋습니다.

성분·함량 1캡슐 중

폴리사카리드철착염 (KPC) 326.1mg
(철(Fe)로서 150mg)

※ 이 제품은 타르색소를 사용하지 않았습니다.


성상 검은 갈색~검정색의 과립이 충전된 상부 농갈색, 하부 투명의 경질캡슐제



효능·효과 철 결핍성 빈혈



용법·용량 성인 : 1일 1회 1캡슐(철로서 150mg)을 복용합니다.



1. 절취선을 따라 자릅니다.



2. 화살표 부분을 잡고 중이를 벗겨냅니다.



3. 볼록한 부분을 눌러 알약만 꺼내 복용합니다.

사용상의 주의사항

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관합니다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락합니다.

2. 다음 환자는 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 혈색소증(철 대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직 장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의 (헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 철 이용 장애(예 : 납중독으로 인한 빈혈, 철 불용성(녹지 않는) 빈혈, 지중해 빈혈, 만발성 피부 포르피린증) 환자
- 5) 비철결핍성 빈혈 환자(예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈)
- 6) 골수 부족에 의한 빈혈 환자
- 7) 만성 용혈성(적혈구 파괴성) 빈혈 환자
- 8) 철 과잉증 환자
- 9) 감염이나 종양으로 인한 철 결핍성 빈혈 환자(철이 세망 내피계에 축적되어 이용에 장애를 받을 수 있으므로 1차 질환이 치료된 후 복용하십시오.)
- 10) 만성 췌장(이자)염 환자
- 11) 간경변 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용(먹는)테트라사이클린계 항생제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 우유·유제품은 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타남)대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 발작성 야간 혈색소뇨증 환자(용혈을 유발하여 병태(병의 상태)를 악화시킬 수 있습니다.)
- 5) 신장에(신장장애) 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 철 함유제제(철분제, MRI용 간장 조영제 등)를 복용중인 환자
- 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.)
- 9) 퀴놀론계, 페니실라민, 콜레스티라민, 헤파(이자)엑스 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람
- 10) 철분 제제와 디포스폰산 염류, 티록신, 세프디니르 제제를 동시 복용하는 사람(이 제제들의 흡수가 감소되므로 일정한 시간 간격(2~3시간 이상)을 두고 복용하십시오.)


6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민반응
- 2) 복부(배부분)·위통증, 위 경련
- 3) 구토, 설사
- 4) 열, 혼수
- 5) 때때로 AST, ALT의 상승, 드물게 ALP 상승
- 6) 구역, 식욕부진, 변비, 흑변(검게 변함), 치아변색, 위부불쾌감
- 7) 과량 복용으로 인해 구역, 구토, 변비, 설사 등의 위장증상, 식욕부진, 복통(배아픔), 토혈(혈액구토), 직장출혈, 무기력, 순환장애 또는 과혈당증, 대사성 산증, 간 효소 수치 상승, 색소침착, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 권태감, 부종(부기), 중독될 경우 소화기관의 협착(좁아짐) 유발
- 8) 과량 복용으로 인한 위장관 장애와 순환 부전을 수반한 허탈의 경우에는 구토를 시킨 후 탄산염과 우유를 복용시켜 위세척을 하십시오.


7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 합니다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 합니다.(예 : 만성질환에 의한 빈혈은 철분 복용이 유효하지 않습니다.)
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 복용 중에는 혈액 검사를 실시하고, 과량 복용하지 않도록 주의하십시오.
- 5) 아스코르브산(비타민 C) 200mg 이상과 함께 복용할 경우 철분의 흡수가 증가 될 수 있습니다.


8. 저장상의 주의사항



1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.



3) 오·남용(잘못사용)을 피하고 품질을 보호·유지 하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호/사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.

예) 제조번호 #1301, 사용기한 2016년 1월 6일인 경우 → "LOT1301 EXP16/01/06"로 표시

포장단위 100캡슐

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서의 최근 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

설명서개정일자 2013. 7. 22
제품의 사용기한은 외부포장에 표기



제조판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 노량진로 74
공장 : 충북 청원군 오창읍 연구단지로 219

www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자요금부담)