



핀베린[®]정

(피나베룸브롬화물)

ILDONG

전문의약품	분류번호	239(기타의 소화기관용약)
-------	------	-----------------

핀베린정은 장과 평활근에 매우 선택적으로 작용하는 칼슘 차단제로서, 과민된 평활근을 자동조절해주는 IBS (과민성 대장 증후군) 치료제입니다.

위장관 운동조절은 신경 및 호르몬 양쪽의 작용을 받으나 최종 단계는 Ca^{2+} 의 활성화에 의해 이루어지는데, 핀베린정은 소화관 평활근에 직접 작용해 Ca^{2+} 의 평활근 세포내 과잉유입을 억제함으로써 소화기 평활근의 경축, 경련, 운동이상 등을 조절합니다. 핀베린정은 세계 50여개국에서 발매되고 있는 유효성과 안전성이 확립된 우수한 약물입니다.

원료약품의 분량 (1정중)

피나베룸브롬화물(KP) 50.0mg

첨가제 (타르색소) : 황색5호

성상

이 약은 주황색의

원형 필름코팅정입니다.

ID

특징

1. 위장관 평활근에 대한 선택성이 심근에 비해 훨씬 크며 전신흡수가 투여량의 10%이하로 낮고 장관에서 10~25%가 흡수되므로 치료용량에서는 중추 및 심혈관계에 대한 부작용이 거의 없습니다.
2. 치료용량에서 항콜린성 부작용없이 소화관 평활근을 조절하므로 전립선 비대증이나 녹내장을 가진 IBS 환자에게도 유효합니다.
3. 단백질합률이 크고 간에서 빠르게 대사되어 담즙배설되므로 전신적 부작용이 거의 없습니다.
4. 항응고제, 혈당강화제, digoxin 등 주요 약물과 상호작용이 없는 내약성이 우수한 약물입니다.
5. 대장 말단부 (S상 결장)에서의 전체적인 운동은 감소시키나, 정상적인 운동에는 영향을 미치지 않으며, 기타 상부소화기관이나 담도에도 작용하여 통증과 관련된 담도기능 장애에 효과적입니다.

효능·효과

과민성대장증후군(복통, 복부팽만감, 복부경련, 변비, 설사, 변비와 설사의 반복, 구역, 구토), 담관운동부전

용법·용량

성인 : 피나베룸브롬화물로서 1회 50mg(1정)을 1일 3회 식사중에 충분한 물과 함께 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

ILDONG

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 임부 및 수유부
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 신중투여

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

3. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 경미한 소화기장애가 나타날 수 있습니다.
- 2) 과량투여 : 설사와 복부팽만감이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

MAO저해제와의 병용투여는 피하는 것이 바람직합니다.

저장방법

기밀용기, 실온 (1~30℃)보관

포장단위

30, 300정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2014년 12월 8일자로 작성되었으며 이 후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우림로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단로 25

소비자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030082-1141208

ILDONG