

지노-브이[®] 질 연질캡슐

(네오마이신항산염 · 니스타틴 · 폴리믹신B항산염)

※ 먹지 마세요

전문약품

분류번호 255

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

주성분 : 네오마이신항산염(KP)	50.2mg
(역가 : 네오마이신으로서 35mg, 35,000 IU)	
니스타틴(KP)	100,000 IU
폴리믹신B항산염(KP)	35,000 IU
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.12mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.03mg
첨가제(타르색소) : 황색203호	
동물유래성분 : 젤라틴(소, 가축), 황납(벌, 벌집)	
부형제 : 디메티콘, 아자경화유, 중쇄트리글리세리드	
착색제 : 산화티탄	
캡슐기재 : 농글리세린, 디메티콘	

【성상】 미황색의 내용액을 함유한 유백색 타원형 연질캡슐형 질좌제

【효능·효과】 비특이성 세균성질염의 국소 치료

【용법·용량】 성인 : 1일 1캡슐을 6일간 저녁에 침내에 깊숙이 삽입한다.
중증 또는 만성 감염의 경우 1일 1캡슐을 6~12일간 저녁에 투여한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약 성분에 과민반응 환자 2) 곤돌, 질내 피임용격막을 사용하는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
살정제를 사용하는 환자
- 이상반응
1) 접촉성 알레르기성 습진이 나타날 수 있으며 특히 장기간 사용시 자주 나타난다. 때때로 점막자극과 드물게 과민 반응이 나타날 경우에는 사용을 중지한다. 2) 대두유로 인한 과민반응이 일어날 수 있다.
- 일반적 주의
1) 신장 및 청각 등에 대해 전신적 독성을 일으킬 수 있으므로 단기간 사용하는 것이 바람직하다. 2) 신부전 환자 또는 2차 전신 독성이 나타난 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하며 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 사용한다. 3) 항생물질 또는 그 유사 제제를 사용시 과민반응이 생기는 경우에는 이 약 사용을 특히 주의한다. 4) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현 등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소기간만 투여한다.
- 상호작용
1) 이 약은 곤돌, 질내 피임용격막과 같은 라텍스 또는 고무제품을 약화시킬 수 있으므로 주의한다. 2) 이 약은 살정제의 피임력을 약화시킬 수 있으므로 주의한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물 실험에서 이 약의 최기형성에 대한 증거는 확인되지 않았다. 임상적으로 특정한 기형 혹은 태아독성에 대한 데이터는 확인되지 않았지만, 임부 또는 임신할 가능성이 있는 여성에 대한 실험은 충분치 않으므로 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 2) 수유부에서 약을 이행에 대한 데이터가 없으므로 수유부는 이 약을 사용하지 않는다.
- 적용상의 주의
1) 이 약은 질에만 사용하고 내복용으로는 사용하지 않는다. 2) 생리기간 중에도 치료를 중단하지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 25℃ 이하에서 보관

【포장단위】 96캡슐(6캡슐/PTP×16)

【제조사】 콜마파마㈜ - 충청북도 제천시 바이오밸리로 93

【제조외도자·판매자】 유니메드제약㈜ - 충남 아산시 실목로 110-27

첨부문서 작성년월일 : 2017, 08, 23

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국·병원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인하실 수 있습니다.

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

UNIMED 유니메드제약

서울특별시 송파구 잠전로 69 (잠실동) 유니메드빌딩