

※ 의약품 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

사데닌 정

(S-Adenosyl-L-Methionine-Sulfate-Tosilate)

전문 의약품
분류번호 : 따로 분류되지
않는 대사성 의약품(03990)



【원료약품의 분량】 1정 중

S-아데노실-L-메티오닌 황산토실산염(KP)
(S-Adenosyl-L-Methionine-Sulfate-Tosilate) 384.0 mg
(S-아데노실-L-메티오닌으로서 200mg)
첨가제(타르색소) : 황색5호 알루미늄레이크,
황색203호 알루미늄레이크

【성 상】 미황색의 원형 장용성 코팅정제

【효능·효과】 활동성 퇴행성 관절증, 우울증

【용법·용량】

1. 활동성 퇴행성 관절증

■ 성인 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 200mg 1일 2회 식전 30분에 경구투여하며, 이 약으로서 1회 400mg 1일 3회까지 증량하여 투여할 수 있다.

2. 우울증

■ 성인

- 개시요법 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400mg 1일 2~3회 15~30일 간 경구투여 한다.
- 유지요법 : 1회 200mg 1일 2~3회 경구투여 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민반응 환자
- 2) 정신분열증 환자
- 3) 양극성장애 환자
- 4) 소아
- 5) 임부 및 수유부

2. 이상반응

- 1) 과민반응 : 안면부종, 혀와 후두 내부의 경직, 천식성 호흡곤란, 빈맥(빠른맥), 급격한 혈압강하, 속이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 위장관 불쾌감, 구역, 구토, 경미한 복부통증, 위장관출혈, 드물게 변비, 복부 팽만감, 소화불량이 나타날 수 있다.

3) 피부 : 발진, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있다.

4) 기타 : 때때로 수면장애, 드물게 구강건조증, 두통, 피로가 나타날 수 있다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신 중의 투여에 대한 임상경험이 충분하지 않으므로 투여하지 않는다.

2) 모유 중으로의 이행여부가 알려져 있지 않으므로 투여하지 않는다.

4. 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

수송이나 보관도중 용기에 금이 가거나 장기간 열에 노출되어 변색이 된 것은 교환하여 사용하는 것이 바람직하다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30 ℃)

【포 장 단 위】 자사 포장단위

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 : 02-2206-3800에서 확인 할 수 있음.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고 의약품용어설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"

문서작성년월일 : 2001.08.03

문서개정년월일 : 2015.11.24

참고 사항

본 제품은 인습성이 강한 제제로서 조제시에도 호일포장을 개봉하면 안됩니다.

"가능한 서늘한 곳에
보관하십시오."

(따뜻한 곳에 두지 말 것)

제조 발매원

초당약품공업(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 381